

ឯកសារច្រើង

ស្ថានភាពនៃការរស់នៅជីវិតក្នុងភូមិក្បាលមេស

ភាគន្លៀសនៃប្រទេសកម្ពុជា

DRAFT

Introduction to Livelihoods in Kbal Romeas Village, Northeast Cambodia



សេចក្តីជ្រៀង ស្ថានភាពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងភូមិក្បាលរមាសភាគឥសានប្រទេសកម្ពុជា

ខែកុម្ភៈ ២០១៦

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ Mekong Watch សហការជាមួយអង្គការបណ្តាញការពារទន្លេបី (3S Rivers Protection Network)

អង្គការ Mekong Watch

អាគារ 3F Aoki ១-១២-១១ Taito, Taito-ku, Tokyo ១១០-០០១៦ ប្រទេសជប៉ុន

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +៨១ ៣ ៣៨៣២ ៥០៣៤

គេហទំព័រ៖ <http://www.mekongwatch.org/index.html>

សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@mekongwatch.org

អង្គការបណ្តាញការពារទន្លេបី (3S Rivers Protection Network)

ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥ ៧៥ ៩៧៤ ១១២

គេហទំព័រ៖ <http://www.3spn.org/>

សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@3spn.org

រូបថតដោយ៖ ដាំ សំណាង ភូ ប៊ុនថាន់ ប្រ៉ុច វិទ្យា Fumiko Takahashi ថង សារិន និងអង្គការបណ្តាញការពារទន្លេបី

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ៖ ដាំ សំណាង ណែន ស៊ុគិត (3SPN) ភូ ប៊ុនថាន់ (3SPN) ប្រ៉ុច វិទ្យា ថង សារិន

និងអ្នកភូមិក្បាលរមាស

មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម

ប្រវត្តិភូមិ

ការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងស្ថានភាពចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងភូមិ

ជំនឿលើអារក្សអារក្សអ្នកតា

ប្រតិទិននៃការចិញ្ចឹមជីវិត និងបញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍នេសាទ និងធនធានធម្មជាតិ

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ ប្រតិទិននៃការចិញ្ចឹមជីវិតតាមរដូវកាលរបស់ភូមិក្បាលរមាស

ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ ឧទាហរណ៍ពីប្រភេទត្រីក្នុងភូមិក្បាលរមាស

ឧបសម្ព័ន្ធ៣៖ ឧទាហរណ៍ពីឧបករណ៍នេសាទក្នុងភូមិក្បាលរមាស

ឧបសម្ព័ន្ធ៤៖ ឧទាហរណ៍ពីប្រភេទអនុផលព្រៃឈើក្នុងភូមិក្បាលរមាស

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះ រៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនភូមិក្បាលរមាស និងពីជំនឿសាសនារបស់ពួកគេ។

កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ អង្គការ Mekong Watch

និងអង្គការបណ្តាញការពារទន្លេបី (3SPN) បានសហការជាមួយអ្នកភូមិ (រួមមានស្ត្រី ចាស់ទុំ សមាជិក/សមាជិកាក្រុមយុវជន។ល។

ដែលបន្តរស់នៅក្នុងភូមិទោះបីជាត្រូវរស់នៅធ្វើស្រែ/ចំការ)

រៀបចំធ្វើផែនទីកំណត់ទីតាំងធនធានធម្មជាតិមានប្រយោជន៍

ដែលមាននៅជុំវិញភូមិរបស់ពួកគាត់។ បន្ថែមពីលើនេះ កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

បុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការបណ្តាញទន្លេបី (3SPN) ឈ្មោះ ណែន ស៊ុតិត

ដែលនាងជាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តរតនគិរី និងជាអ្នកយល់ដឹងជ្រៅជ្រះពីវប្បធម៌

និងរបៀបរបបនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ បានជួបសម្ភាសន៍អ្នកភូមិពីររូប

រួមមានឈ្មោះ ដាំ សំណាង និង ឡាញ់ ស្រាង

ហើយបានចងក្រងព័ត៌មានសម្ភាសន៍នេះជាឯកសារប្រតិទិនស្តីពីការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងភូមិ។

ជាមួយកិច្ចសហការនេះ រូបភាពធនធានធម្មជាតិ (ត្រី និងអនុផលព្រៃឈើ)

ដែលបានចុះបញ្ជីពេលធ្វើផែនទីកំណត់ទីតាំង និងបទសម្ភាសន៍ត្រូវបានចាត់តាំងយក។

រូបថតទាំងនោះ នឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃឯកសារនេះ។



អំពីភូមិក្បាលរមាស

ភូមិក្បាលរមាស

ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្បាលរមាស ស្រុកសេសាន
ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ភូមិនេះ

ស្ថិតតាមបណ្តោយដងទន្លេស្រែពក

(ជាភាសាព្រំមានថា វ៉ាឡាយស្រែពក)។

ភូមិក្បាលរមាស មានព្រំដែនរួមជាមួយភូមិស្រែគរ

ភូមិត្របីជ្រំ និងភូមិស្រែ ស្រណុក។



ភូមិនេះមានក្រឡាផ្ទៃ៥៥៥ ហិ.ត និងមានប្រជាជនសរុប១២៧គ្រួសារ ដែលស្មើ៧៥០
នាក់។ ប្រជាជនក្នុងភូមិនេះ ភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចព្នង។

យោងតាមប្រពៃណីភូមិ ប្រជាជនភូមិក្បាលរមាស

ធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះ វ៉ែន ចាន់ ដែលស្ថិតតាមដងទន្លេសេកុង។ កាលនោះ

មានប្រជាជនតែ៣០គ្រួសារប៉ុណ្ណោះរស់នៅទីនោះ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៣៧

ពួកគេបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ភូមិរំពេរ (ប្រមាណ៧ គ.ម ភាគពាយព្យនៃភូមិសព្វថ្ងៃ

និងស្ថិតក្នុងរង្វង់ដែនដីភូមិក្បាលរមាសបច្ចុប្បន្ន)។ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តី ដោយសារ

មានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ (អ្នកភូមិមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា

ការស្លាប់នេះជាបាតុភូតមួយដែលបង្កឡើងពីការខឹងសម្បាររបស់អារក្សអារក្សអ្នកតា

ចំពោះមនុស្សដែលល្មើសតំណាមរបស់ខ្លួន) នៅឆ្នាំ១៩៧៣

ពួកគេក៏បានវិលមករស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមាសវិញ។ កាលនោះ អ្នក

ភូមិបានឃើញសត្វរមាសមួយក្បាលស្លាប់ក្នុងថ្នកត្រពាំងមួយដ៏ធំ។

អ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្តើមហៅត្រពាំងនេះថា ត្រពាំង ក្បាលរមាស

ហើយក្រោយៗមកភូមិនេះក៏ត្រូវបានហៅថាភូមិក្បាលរមាសតែម្តង។

ចាប់តាំងពីមានការសាងសង់ទំនប់នៅប្រទេសវៀតណាម

នៅខ្សែទឹកភាគខាងលើនៃទន្លេស្រែពក អ្នក

ភូមិជាច្រើនបានទទួលរងការឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរពីចរន្តទឹកគង្គុកភ្លាមៗ ដែលធ្វើអោយមានការបាក់ច្រាំងទន្លេព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានកំណកកករទឹក និងបំពុលទឹកផងដែរ។ ការនេសាទ នៅតែដំណើរការធម្មតា ប៉ុន្តែបរិមាណផលចាប់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យបារម្ភ ជាពិសេសចាប់តាំងពីទំនប់ត្រូវបានសាងសង់។

ជាងនេះទៀត ភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់អាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់សេសានក្រោម២ ដែលបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ថ្មីៗនេះ ហេតុដូច្នេះនេះ

ភូមិនេះត្រូវប្រឈមមុខចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ ទោះបីយ៉ាងណានេះក្តី អ្នកភូមិជាច្រើន មិនចង់បោះបង់ទន្លេ និងភ្នំរបស់ពួកគេទេ ម្យ៉ាងទៀត

ដោយសារពួកគេគិតថាផ្លូវកប់ខ្មោចដូនតា និងទីសក្ការៈបូជារបស់ពួកគេ មិនអាចត្រូវបំផ្លាញ និងសាងសង់ថ្មីឡើងវិញនៅទីតាំងថ្មីបាន ដូចនេះ ពួកគេបាននឹងកំពុងបដិសេធ មិនព្រមចាកចេញពីទីតាំងចាស់របស់ពួកគេទេ បើគិតមកដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងស្ថានភាពចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងភូមិ

អ្នកភូមិភាគច្រើនរស់នៅដោយពី ឯផ្នែកទៅលើធនធានធម្មជាតិ និងធ្វើកសិកម្ម ដូចជាធ្វើស្រែ/ចំការ ចិញ្ចឹមសត្វ នេសាទត្រី ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ និងបរាញ់ជាដើម។



ទីកន្លែងសំខាន់ៗសម្រាប់ពួកគេប្រកបរបរ គឺនៅក្នុងព្រៃ តាមទន្លេ អូរ ត្រពាំង វាលស្រែ និងតំបន់ដាំដុះផ្សេងៗទៀត។

ព្រៃឈើគឺជាទីកន្លែងដែលប្រជាជនអាចប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ ទាំងអាចហូប និងមិនអាចហូបបាន។ មានតំបន់ព្រៃខ្លះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រៃឈើពិសេស សម្រាប់ធ្វើជាទីកន្លែងសក្ការៈរបស់ពួកគេ។ តំបន់ព្រៃដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះ នឹងមានបង្ហាញខាង ក្រោម។

ទន្លេក៏ជាប្រភពទឹកដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកភូមិផងដែរ
ព្រោះវាជាទឹកនៃឆ្នេរដែលពួកគេអាចដូតទឹក បោកសំលៀកបំពាក់
និងធ្វើការស្រោចស្រពផលដំណាំផ្សេងៗ។ ម្យ៉ាងទៀត
ក្រៅពីដើរតួនាទីជាបណ្តាញដឹកជញ្ជូនដ៏ចាំបាច់ហើយនោះ
ទន្លេក៏ជាទឹកនៃឆ្នេរដែលអាចផ្តល់ម្ហូបអាហារផងដែរ ដូចជាត្រី ពពួកត្រី លាស ខ្មៅ ខ្នង ។ល។
ចំណែកស្រែវិញ ក៏សំខាន់ណាស់ដែរ
គឺវាជាទឹកនៃឆ្នេរផលិតដំណាំស្រូវដែលជាអាហារមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជន
ហើយវាក៏ជាទឹកនៃឆ្នេរផ្តល់ចំណីដល់សត្វចិញ្ចឹមដែរ ពិសេសនៅរដូវប្រាំង។
តំបន់ដីសើមមួយចំនួន ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាស្រែផងដែរ
គឺរុក្ខជាតិដែលដុះលូតលាស់នៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់ដីសើមនោះត្រូវគេយកមកធ្វើជាអាហារ
និងប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ប្រជាជនក្នុងភូមិនេះ ធ្វើស្រែគ្រាន់តែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ។
ស្រូវត្រូវគេដាំនៅទីកន្លែងពីរផ្សេងគ្នា ស្រូវចំការ/ស្រូវបុកដាំ និងស្រូវស្រែ/ស្រូវស្ទឹង។
មានអ្នកភូមិខ្លះលក់ស្រូវដែលដាំបានទៅឲ្យគ្រួសារណាដែលមិនមានស្រូវគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូ
ប ប៉ុន្តែមិនលក់ចេញទៅខាងក្រៅភូមិទេ។
ប្រភេទពូជស្រូវ៣យ៉ាងដែលគេដាំជាស្រូវចំការ/ស្រូវបុកដាំ រួមមានស្រូវកន្ទ្រប់
ដែលជាប្រភេទស្រូវស្រាល (អាយុកាល២ខែកន្លះ) ស្រូវកាវ៉ែត និងស្រូវកន្ត្រៃ
ដែលជាស្រូវកណ្តាល (អាយុកាល៣ខែ)។ ស្រូវកន្ទ្រប់មានក្លិនក្រអូប
ចំនែកឯស្រូវកន្ត្រៃវិញមានទាំងក្លិនក្រអូប និងឱជារសឆ្ងាញ់។ ឧបករណ៍ធ្វើស្រែរបស់ពួកគេ
រួមមានដងឈើទ្រវែងស្រួចចុង ដែលគេប្រើដើម្បីបុកដី ដាក់គ្រាប់ស្រូវ
និងធុងធ្វើពីឫស្សីដែលប្រើសម្រាប់ដាក់គ្រាប់ស្រូវ។
នៅឆ្នាំដំបូងនៃវដ្តដំណាំស្រូវចំការ/ស្រូវបុកដាំ ដើមឈើតូចៗ ព្រៃបោះ និងស្មៅ
ត្រូវកាប់កំទេចចោលនៅខែកុម្ភៈ រួចដុតនៅខែមេសា។ ការកំចាត់ស្មៅចង្រៃរបស់ស្រូវ
ត្រូវធ្វើនៅខែឧសភា បន្ទាប់មកនៅខែមិថុនា ទើបប្រជាជនចាប់ផ្តើមព្រួស/បុកដាំស្រូវ។

នៅក្នុងរង្វង់ដីស្រែបុកដាំ/ព្រួស ក៏មានដាំដំណាំល្អៗ ឃ្លោក ននោង ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ម្ទេស ត្រប់ សណ្តែកគួរ និងត្រសក់ផងដែរ ពិសេសនៅតាមដីជំរាលដែលទំនេរអត់មានដាំស្រូវ។

ចំការស្រែមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាំស្រូវតែមួយមុខទេ

ប៉ុន្តែក៏មានដាំបន្លែបង្កាលក្នុងគ្រួសារផងដែរ។

នៅក្នុងស្រូវស្រែ/ស្រូវស្ទឹងវិញ ប្រជាជននិយមដាំពូជស្រូវស្រាលអាយុកាល៣ខែ ស្រូវកណ្តាលអាយុកាល៤ខែ និងស្រូវធ្ងន់អាយុកាល១ឆ្នាំ។ ពូជស្រូវកណ្តាលមួយប្រភេទ ឈ្មោះស្រូវស្ពឺមានគ្រាប់រឹង និងមិនមានឱជារស់ឆ្ងាញ់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកភូមិនៅតែដាំស្រូវនេះ ព្រោះវាផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងអាចដុះលូតលាស់ល្អលើដី គ្រប់ប្រភេទ។ ពូជស្រូវនេះ ត្រូវគេស្ទង់ក្នុងរង្វង់ខែកក្កដា ឬពេលខ្លះបន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ផ្តើមធ្លាក់។ អ្នកភូមិ ក៏មានដាំដំណាំស្វាយចន្ទី និងដំឡូងមីផងដែរ ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែម។ អ្នកភូមិ ក៏មានរក្សាទុកសួនដំណាំនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរដែលភាគច្រើនពួកគេដាំរុក្ខជាតិឱសថ បន្លែស្លឹក និងបន្លែផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃ។

ក្រៅពីដាំស្រូវ កសិករភាគច្រើនក្នុងភូមិក្បាលរមាសក៏ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរ ដូចជាសត្វមាន់ ទា ជ្រូក និងគោ/ក្របីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ និងសម្រាប់លក់ដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ថែម។

នៅក្នុងភូមិ ប្រជាជនប្រើឧបករណ៍នេសាទ៨ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ឧបករណ៍នេសាទប្រភេទថ្លៃសន្ធឹច ត្រូវបានប្រជានេសាទ បែងចែកជា៨ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៣៖ ឧទាហរណ៍ពីឧបករណ៍នេសាទភូមិក្បាលរមាស)។

មានអនុផលព្រៃឈើជាច្រើនប្រភេទ ដែលគេអាចរកបាននៅក្នុងភូមិ។ ប្រភេទអនុផលសំខាន់ៗ រួមមានពពួកផ្លែឈើហូបបាន ពពួកផ្សិតហូបបាន ប្រភេទអនុផលប្រើជាថាមពល និងប្រភេទអនុផលដែលគេប្រើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ៤៖ ឧទាហរណ៍ពីអនុផលព្រៃឈើភូមិក្បាលរមាស)។ ក្រៅពីព្រៃឈើ អ្នកភូមិក៏បានអនុវត្តការស្វែងរកផល និង អនុផលពីទន្លេ

តាមមាត់ទន្លេព្រមទាំងនៅតាមស្រែផងដែរ។ ការបរិច្ចាគក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរនៅក្នុងព្រៃ។

ជំនឿលើអារក្សអេក្ស អ្នកតា

ក្នុងភូមិនេះ មានកន្លែងជាច្រើន
ដែលអ្នកភូមិចាត់ទុកជាកន្លែងសក្ការៈស
ប្រាប់គោរពបូជា
ហើយពួកគេហៅទីកន្លែងទាំងនោះថាជាតំ
បន់ **អ្នកតា** គង់នៅ។ **អ្នកតា**
គឺជាដួងព្រលឹង ឬ
វិញ្ញាណដែលសន្តិសុខនៅទីកន្លែងណាមួយ។



នៅក្នុងភូមិក្បាលរមាស មានទីកន្លែងជាច្រើនដែលគេចាត់ទុកជាកន្លែងសក្ការៈ
រួមមានអ្នកតារុំពេរលើ អ្នកតារុំពេរកណ្តាល អ្នកតារុំពេរក្រោម អ្នកតាត្រពាំងថ្ម អ្នកតាក្បាលភ្នំ
អ្នកតាភ្នំរឿង អ្នកតាស្រែវែង អ្នកតាឫស្សី អ្នកតាស្រែក្រាញ់ អ្នកតាស្នែងក្របី អ្នកតាផ្អែម
អ្នកតាស្រែកេសកុំ អ្នកតាស្រែពក និងអ្នកតាកុតបូ។ អ្នកភូមិជឿថា មានដួងព្រលឹង/វិញ្ញាណ
រស់នៅតាមតំបន់ទាំងអស់នេះ។ លើសពីនេះ ទីកន្លែងមួយចំនួន ដូចជាទួល យាយកែវ
និងរុំពេរកណ្តាល ត្រូវគេស្គាល់ថាជាតំបន់ព្រៃកប់ខ្មោច។ ជំនឿទាំងអស់នេះ
ត្រូវបានកំណត់តាមប្រពៃណីក្រុមជនជាតិរបស់ពួកគេ ហើយប្រជាជនទៅធ្វើពិធីបន់ស្រន់
និងគោរពបូជានៅទីនោះជាញឹកញាប់ ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងគ្រួសារ។

អ្នកតាក្បាលភូមិ៖ ស្ថិតនៅជាប់ខាងក្រៅតំបន់មនុស្សរស់នៅក្នុងភូមិ
ចំនែកឯទីអាស្រមរបស់ព្រលឹង/វិញ្ញាណវិញ ស្ថិតនៅមាត់ច្រកចូលភូមិតែម្តង។
អ្នកភូមិភាគច្រើនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមប្រពៃណី
និងធ្វើការបន់ស្រន់ដល់ដួងព្រលឹង/វិញ្ញាណទាំងនោះតាមទំនៀមទំលាប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា
។ ពួកគេធ្លាប់រៀបចំពិធីឡើងអារក្សអ្នកតា ជាពិសេសនៅពេលគោ/ក្របីរបស់ពួកគេបានបាត់
ឬនៅពេលពួកគេមានបញ្ហា ឬកើតជម្ងឺផ្សេងៗ។ នៅពេលពួកគេចេញទៅស្រែ
ឬពេលពួកគេវិលចូលភូមិវិញ ពួកគេក៏ត្រូវធ្វើពិធីបន់ស្រន់ដល់អារក្សអ្នកតាផងដែរ។

ចំពោះទីតាំងវិញ អ្នកភូមិបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដូចខាងក្រោម៖

កាលពីព្រេងនាយ

មានអារក្សដែលគេស្គាល់ថាជា **អ្នកតាវិន**

ចូលមកពន្យល់សពអ្នកភូមិដោយនិយាយ

ថា គាត់ចង់រស់នៅជាមួយអ្នកភូមិ

ហើយបានសុំឲ្យអ្នកភូមិសាងសង់ទីអាស្រម

មួយសម្រាប់គាត់។ គាត់បាននិយាយថា



គាត់នឹងនៅថែរក្សាអ្នកភូមិ និងធានាពីសេចក្តីសុខសុភមង្គលជូនចំពោះអ្នកភូមិត្រប់ៗគ្នា។

នៅពេលនោះ ប្រជាជនក៏មិនបង្អង់យូរដែរ បាននាំគ្នារៀបចំសាងសង់ទីអាស្រមមួយជូនគាត់។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្នកភូមិទាំងអស់ ពិតជាបានរស់នៅដោយសុខសន្តិភាព

ហើយពួកគេបានជឿ និងធ្វើការបន់ស្រន់ចំពោះអារក្សនោះជារៀងរហូតមក។ ក្រោយមក

អ្នកភូមិបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះអារក្សនេះ ពី **អ្នកតាវិន** ទៅជា **អ្នកតាក្បាលភ្នំ** ជំនួសវិញ។

ប្រជាជនភូមិក្បាលរមាស ជឿថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកតាក្បាលភ្នំទេ ជីវិតរបស់ពួកគេ

ក៏មិនមានសុវត្ថិភាព ហើយពួកគេក៏មិនអាចបានសុខដែរ។ ជំនឿលើអ្នកតាក្បាលភ្នំ

គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះអ្នកភូមិ

ក្នុងការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធភាគតិចព្នង។

ព្រែកប៉េខ្មោច៖ នៅពេលនរណាម្នាក់លាចាកលោកនេះទៅ

សាកសពនឹងត្រូវគេយកទៅកប់នៅក្នុងព្រែកប៉េខ្មោចដោយឥតមានការបូជាឡើយ។

អ្នកភូមិភាគច្រើន មិនដឹងច្បាស់ថាតើព្រែកប៉េខ្មោចនេះធំប៉ុណ្ណានោះទេ

ប៉ុន្តែវាពិតជាធំគួរសម្បា។ នៅតំបន់ខ្ពង់រាបកប់ខ្មោចនេះ មានពាងទឹក មានឆ្នាំង បាន ខោអាវ

ទង់រៀងក្រពើ និងវត្ថុផ្សេងៗ ដែលជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យវាលកប់ខ្មោច។ ព្រែកប៉េខ្មោចនេះ

ត្រូវបានគេជឿថាជាទីកន្លែងដែលដួងព្រលឹង ឬវិញ្ញាណដូនតា

ដែលបានចែកឋានទៅហើយស្ថិតនៅ។ អ្នកភូមិជឿថា ដួងព្រលឹង/វិញ្ញាណទាំងនេះ

នៅវិលវល់មិនបានចាកចេញទៅកាន់ភពថ្មី។ ម្យ៉ាងទៀត

ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បានប្រព្រឹត្តរឿងខុសឆ្គង ដូចជាលួចពាងទឹក ឆ្មាំងដាំបាយ ឬបាន
ឬសាងសង់អាស្រមថ្មីឲ្យព្រលឹង/វិញ្ញាណនោះ
អ្នកនោះនឹងតម្រូវឲ្យសុំខមាទោសចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើ ដោយធ្វើការសែនថ្វាយជាជ្រូក
ឬគោ/ក្របី ដើម្បីសុំកុំឲ្យជួបបញ្ហាគ្រោះភ័យផ្សេងៗ។

DRAFT Introduction to Livelihoods in Kbal Romeas Village, Northeast Cambodia

February 2016

Published by Mekong Watch in cooperation with 3S Rivers Protection Network

Mekong Watch

3F Aoki Building 1-12-11 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016 Japan

Tel: +81 3 3832 5034

Website: <http://www.mekongwatch.org/index.html>

E-mail: info@mekongwatch.org

3S Rivers Protection Network

Banlung Town, Ratanakiri Province, Cambodia

Tel: +855 75 974 112

Website: <http://www.3spn.org/>

E-mail: info@3spn.org

Photos: Samnang Dam, Bunthann Phou, Rithy Pruch, Fumiko Takahashi, Sarin Thong, and 3S Rivers Protection Network

Special thanks to: Samnang Dam, Soukit Nen (3SPN), Bunthann Phou (3SPN), Rithy Pruch, Sarin Thong, and Kbal Romeas Village

Table of contents :

Introduction

About the village

Land use and livelihood of the village

Belief in spirits

Livelihood Calendar and List of Tools and Natural Resources

Appendix 1: Kbal Romeas Village Seasonal Livelihood Calendar

Appendix 2: Examples of Kbal Romeas Village Fish

Appendix 3: Examples of Kbal Romeas Village Fishing Gear

Appendix 4: Examples of Kbal Romeas Village NTFPs

Introduction


This catalog is an introduction to the natural resources used in the daily lives of the people of Kbal Romeas Village, and their beliefs.

In July 2014, Mekong Watch and the 3S Rivers Protection Network (3SPN), in collaboration with the villagers (women, the elderly, members of the youth group, etc. who remain in the village even during the busy farming season), mapped locations where natural resources considered by the villagers to be important exist in the surroundings of the village. In addition, in August 2015, a member of the 3SPN staff, who is herself a resident of Ratanakiri Province, and who has a deep understanding of the culture and livelihoods of the region, Soukit Nen, interviewed two of the villagers, Samnang Dam and Lanh Srang, and compiled a livelihood calendar of the village. With the cooperation of the villagers, photographs of the natural resources (fish and non-timber forest products) that were listed during the mapmaking and interviews were taken and these are shown in the appendices to this report.



About the village

Kbal Romeas Village is located in Kbal Romeas Commune, Sesan District, Stung Treng Province. The village is along the Srepok River (Ralay Srepok in the Bunong language). Kbal Romeas village shares boundaries with Sraekor Village, Krobey Chrom, and Srae Sranok Village. The total land area of the village is 555 hectares. Kbal Romeas Village currently has a total population of 127 families, 750 people. The villagers are mainly of Bunong ethnicity.



According to village tradition, the villagers of Kbal Romeas once lived in a village called “Veun Chan” along the Sekong River. There were only 30 families living there. In 1937, they moved to Rompe Village (about 7 km southwest of the present village and within the boundaries of the current Kbal Romeas Village). However, as many people died there (the villagers strongly believe that this

was a phenomenon caused by the anger of spirits toward people who broke the taboos), in 1973 they came to live in Kbal Romeas Village. There was a big pond in which a rhinoceros was seen by the villagers to have died. The villagers started to call this pond Trapeang Kbal Romeas (Pond of the Rhinoceros Head), and thereafter called this village Kbal Romeas.

Since the construction of the dams in Vietnam, in the upper reaches of the Srepok River, the villagers have suffered from sudden fluctuations in the river water level and the associated river bank collapses, as well as water turbidity and pollution. Fishing is still widely practiced in the village, but fish catches have declined dramatically since the dams were built.

Moreover, the village lies within the reservoir of the Lower Sesan 2 Dam, the construction of which began in 2014, and is therefore targeted for relocation. Many of the villagers, however, do not want to abandon their rivers and mountains, and because they consider that the graves of their ancestors and their spirit shrines cannot be dismantled and reconstructed in a different location, are refusing to relocate as of January 2016.

Land use and livelihood of the village

The villagers are greatly dependent on natural resources and earn their living by farming, rearing animals, fishing, gathering and hunting. Important places for them are forests, river, streams, ponds, rice fields, and other farmland.

The forests are places where edible and non-edible NTFPs are gathered and fuelwood can be obtained. Also, as will be shown below, there are special forests where the spirits live.



The river is also an important water source for the villagers, since that is where they bathe, wash clothes and obtain water for irrigation. In addition, as well as being important transportation networks, rivers are also crucial for the gathering of food such as fish and shellfish. Rice paddies are the place where rice, the staple food, is produced, but they are also where livestock are grazed in the dry season. Wetlands are also used as rice paddies, the plants that grow in and around wetlands being used for food and other purposes.

Subsistence rice farming is practiced in the village. Rice is produced in both swidden fields and wet rice paddies. Some villagers sell rice to households that have insufficient rice, but do not sell rice outside the village. Three main varieties are grown in swidden fields; Srov Kantrup, an

early-maturing variety (two-and-a-half months), Srov Kavet and Srov Kantrey, medium-maturing varieties (three months). Srov Kantrup has an especially good aroma, and Srov Kantrey is considered to have both a good flavor and good aroma. The farming tools include a long pointed wooden stick used to make holes for sowing rice seeds and bamboo containers for storing the rice seeds. For the first year in the cycle of a swidden rice field, small trees, shrubs and grass are slashed in February and burned in April. Weeding is done in May and rice is sown in June. Within the upland (swidden) rice field, farmers also grow pumpkins (Lapov in the Khmer language), bottle gourds (Khlauk), luffa gourds (Nornaung), lemon grass, Romdenh, chili, eggplants, long beans, and cucumbers in the burned areas or at the base of mounds. Swidden fields are not used to grow rice alone; they are also crucial as a place where subsistence vegetables are grown.

In the paddy fields, three early-maturing varieties, four medium-maturing varieties and one late-maturing variety are cultivated. One of the medium-maturing varieties, Srov Sken, has a hard grain and does not have a good flavor. However, the villagers grow it because it gives a good yield and can grow in a range of soil types. The timing of rice seedling transplantation is around July, sometime after the rainy season has started. The villagers produce cashew nuts and cassava for cash income. Villagers also keep a kitchen garden near their homes, where they grow herbs, leafy vegetables and other plants for everyday meals.

Apart from cultivating rice, the majority of farmers in Kbal Romeas Village also raise animals such as chickens, ducks, pigs and cattle for family consumption as well as for sale to generate additional cash income to support their livelihoods.

In the village, eight different kinds of fishing gear are used. Villagers who use fishhooks for fishing categorize them into seven different types. (See Appendix 3: Examples of Kbal Romeas Village Fishing Gear.)

Many Non-Timber Forest Products (NTFPs) are used in the village. The main items are edible tree fruit, edible mushrooms, items used for fuel, and items used as tools. (See Appendix 4: Examples of Kbal Romeas Village NTFPs.) Besides the forests, villagers also practice gathering in rivers, on river banks, as well as in and around paddy fields. Hunting is also carried out in the forests.

Belief in spirits

In this village, there are many places concerning which the villagers hold beliefs in and they call those areas “Neakta”. “Neakta” is the “spirit of a place”.

In Kbal Romeas village, there are places known as Neakta Rompe Leu, Neakta Rompe



Kandal, Neakta Rompe Krom, Neakta Trapaing Thmar, Neakta Kbal Phum, Neakta Phnom Rerng, Neakta Sraeveng, Neakta Russey, Neakta Sraekranh, Neakta Sneng Krobey, Neakta Pha'em, Neakta Srae Keh Kom, Neakta Srae Pok, Neakta Kot Bou. The villagers believe that certain spirits live in these locations. In addition, places known as Tuol Yeay Keo and Rompe Kandal are grave forests. These beliefs are deeply embedded in the tradition of their ethnic group, and the people often go to pray and hold ceremonies in those places in order to live happy lives.

Neakta Kbal Phum ---Neakta Kbal Phum is located just outside the residential area of the village, and thus this spirit shrine is effectively at the entrance to the village. Villagers follow tradition scrupulously and worship this spirit according to the customs. They also organize spiritual ceremonies, especially when the cattle are lost, or people face problems such as illnesses. When they leave to go to their farmland, or when they return to the village, they always make an offering to this spirit.

Concerning this location, the villagers tell the following story.

“Once upon a time, a spirit (Neakta) “Neakta Vin” came to the villagers in a dream, saying that he wanted to live with the villagers and asking the villagers to construct a shrine for him. He said would take good care of the villagers and ensure their prosperity and happiness. They then prepared and constructed the shrine for him. Ever since then the villagers have lived happily, and have believed in and worshipped this spirit. Later, the villagers changed his name from “Neakta Vin” to “Neakta Kbal Phum”.”

Kbal Romeas people believe that without Neakta Kbal Phum, their lives are not safe and they will become unhappy. Belief in Neakta Kbal Phum is important for villagers in expressing their identity as Bunong, an ethnic minority.

The Grave Forest --- When someone in the village passes away, the body is always buried in the grave forest, not cremated. Villagers do not know clearly how big the grave forest is, but it is quite large. At this grave hill, there are water jars, pots, plates, clothes, a crocodile-shaped flag, and other objects that are symbols of the graveyard. The grave forest is believed to be the place where the spirits of the deceased ancestors live. The villagers believe that it cannot be moved to a new location. In addition, if a person commits a wrongdoing such as taking water jars, pots, or plates away, or reconstructs the spirit house, he will have to atone for the wrongdoing by making an offering of pigs or buffaloes to pray to or apologize to the ancestors in order to prevent any suffering occurring to the villagers.



ប្រតិទិនសកម្មភាពវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ												ទីកន្លែង
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	
កសិកម្ម														
ចម្ការស្រែដីខ្ពស់ ការដាំស្រូវប្រភេទស្រូវប្រាំង ព្រោះយើងមិនចាំបាច់ការស្រែ ឬសាបសំណាបទេ គឺគ្រាន់តែ ជ្រះស្មៅឲ្យស្អាត ហើយចាប់ផ្តើមដាំយកតែម្តង ជាធម្មតា ពួកយើងធ្វើចម្ការវិលជុំពី ២ ទៅ៣ឆ្នាំម្តង។	ការរៀបចំដីថ្មី - ការបំបែកដីមេឈើធំៗ - ដុតកម្ទេចចោល - សំអាតស្មៅ	x		x										
	ការដាំ និងការប្រមូលផល ក្រោយពីដាំរួចបានប្រហែល ១៥ ទៅ ២០ ថ្ងៃ ប្រជាជន ត្រូវសំអាតស្មៅបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់ស្រូវរើម ឬមូលដើមទើបឈប់ធ្វើ						x ការដាំ							
	ស្រូវកន្ត្រប់ ជាប្រភេទស្រូវស្រាលមានរយៈពេល២ ខែកន្លះ អង្ករទន់មានគ្រាប់ខ្លី ហើយបាយឆ្ងាញ់ ។										x ការប្រមូលផលផល			
	ស្រូវកាំភ្លើង ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលមានរយៈពេល ៣ខែចាប់ផ្តើមដាំពីខែរហូតដល់ខែ៩ ទើបចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។													
សំភារៈសម្រាប់ដាំមានលើស្រូវ ស្រាប់បុកដី និងបំបែក ឬស្រូវសម្រាប់ដាក់ពូជស្រូវ។ បើ ជាដីថ្មីចាប់ផ្តើមការបំបែក ១២ ទៅ ២២ រហូតដល់ខែ៤។	ស្រូវកន្ត្រី ជាប្រភេទស្រូវ កណ្តាលមានរយៈពេល៣ខែដូចស្រូវ កាំភ្លើងដែរ។ អ្នកភូមិភាគច្រើនដាំស្រូវទាំងបីប្រភេទ នេះព្រោះវាជាប្រភេទស្រូវដែលទន់ ក្រអូបហើយបាយឆ្ងាញ់ទៀត។													
	ស្រូវកន្ត្រប់ ជាប្រភេទស្រូវស្រាលមានរយៈពេល២ ខែកន្លះ អង្ករទន់មានគ្រាប់ខ្លី ហើយបាយឆ្ងាញ់ ។													
	ស្រូវកាំភ្លើង ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលមានរយៈពេល ៣ខែចាប់ផ្តើមដាំពីខែរហូតដល់ខែ៩ ទើបចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។													
	ស្រូវកាំភ្លើង ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលមានរយៈពេល ៣ខែចាប់ផ្តើមដាំពីខែរហូតដល់ខែ៩ ទើបចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។													
ស្ថាពររហូតដល់ខែ១០ទើបដាំស្រូវ។ នៅក្នុងចម្ការដាំស្រូវនេះផងដែរ អ្នក ភូមិយើងក៏ដាំ បន្លែដូចជា ល្ពៅ, ប្លោក, ននោង, ស្លឹកត្រ, ម្សៅ, ម្ទេស, ត្រប់, សណ្តែកគូ, ត្រសក់, លាយឡំគ្នាទៅក្នុងចម្ការនោះនៅកា មកនឹងឆ្នាំដំបូង៖ ឬតាមជើងដីដំបូង។	ស្រូវកន្ត្រី ជាប្រភេទស្រូវ កណ្តាលមានរយៈពេល៣ខែដូចស្រូវ កាំភ្លើងដែរ។ អ្នកភូមិភាគច្រើនដាំស្រូវទាំងបីប្រភេទ នេះព្រោះវាជាប្រភេទស្រូវដែលទន់ ក្រអូបហើយបាយឆ្ងាញ់ទៀត។													
	ស្រូវកន្ត្រប់ ជាប្រភេទស្រូវស្រាលមានរយៈពេល២ ខែកន្លះ អង្ករទន់មានគ្រាប់ខ្លី ហើយបាយឆ្ងាញ់ ។													
	ស្រូវកាំភ្លើង ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលមានរយៈពេល ៣ខែចាប់ផ្តើមដាំពីខែរហូតដល់ខែ៩ ទើបចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។													
	ស្រូវកាំភ្លើង ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលមានរយៈពេល ៣ខែចាប់ផ្តើមដាំពីខែរហូតដល់ខែ៩ ទើបចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។													

សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ											ទីកន្លែង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	
វាលស្រែដីទាប នៅពេលដែលដីមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើស្រែ យើងបានប្រើវាសម្រាប់ដាំកន្លែងព្រៃលែងសត្វ ដូចជាសត្វគោក្របីជាដើម។	ការរៀបចំដី ច្រូតកញ្ជៀងស្រូវ ឬគល់ស្រូវ ហើយប្រមូលមុំដើម្បីដុត។ ការក្នុង ហើយហាលដីក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីសម្លាប់ស្មៅ និងរុក្ខជាតិតូចៗ។ ការក្នុងរាល់ គេចាប់ផ្តើមការដាំស្រូវចាប់ពីខែ៥ ដើម្បីហាលដី និងអោយស្មៅងាប់ ។					x								ស្រែកម្មវិទ្យាល័យមាស ស្រែវិល ស្រែព្រះផ្អែក
	ធ្វើការជ្រើសរើសពូជ ប្រហែលជា២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការរៀបចំដី យើងចាប់ផ្តើមសាបពូជដែលជាម្នា នៅដាច់ជិតនឹងស្រែដែរ។						x							
	ការដាំពូជ និងការទទួលផល ស្រូវនាងតី និងសែនពិ ដោយប្រភេទស្រូវស្រាលស្ទឹងមានរយៈពេល២ខែកន្លះ។								x ការដាំ			x ការប្រមូលផលផល		
	ស្រូវដុល+ផ្កាស្លា និងផ្កាខ្លី៖ ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលហើយស្រូវទាំងបីប្រភេទនេះ ទទួលបាន ផ្កាញ់ និងលក់បានថ្លៃ។									x ការដាំ		x ការប្រមូលផលផល		
	ស្រូវស្ពឺន ជាប្រភេទស្រូវកណ្តាលអង្កររាងវែងមិនសូវធ្លាក់តែគេនិយមដាំក៏ដោយសារផលច្រើន និងមិនរើសដី ។									x ការដាំ		x ការប្រមូលផលផល		

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ												ទីកន្លែង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២		
	ស្រូវនាងណយ ជាប្រភេទស្រូវច្រូងមានរយៈពេល៥ខែ អង្កររឹងឡើងឆ្នាំមានដើមរឹងមាំ ហើយបានផលច្រើន។											x			
ចម្ការ	ស្វាយចន្ទី - សម្អាតស្មៅ (វាអាស្រ័យលើចម្ការ ស្មៅ ច្រើនឬក៏តិច) - ការរើសគ្រាប់ចានី។	x	x	x	x						x				
	ដំឡូងមី - សម្រាប់ដីថ្មី, កាប់ព្រៃ និងដុត - ការដាំ - ការសំអាតស្មៅត្រូវចាប់ផ្តើម បន្ទាប់ពីដំឡូងដុះឡើងផុតពីដី ដើម្បីកុំអោយស្មៅក្របដណ្តប់។ - ការប្រមូលផលអាចចាប់ផ្តើមពីខែ១២ រហូតដល់ ខែ១។		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
សួនបន្លែនៅផ្ទះ	ស្ពៃ - ស្ពៃរៀបចំដីដូចកូនដេរ ខុសត្រង់ស្ពៃយើងត្រូវសាបពូជ លើកានផុតពីដីសាប - ពូជបានពី១៥- ២០ថ្ងៃទើបដកយកទៅដាំនៅលើរោងដៃ លបានរៀបចំរួច។ - ក្រោយពីដាំហើយត្រូវមើលថែដូចជាដាក់ ដីកំប៉ុសស្រោចទឹកដកស្មៅជ្រាយដី។	x	x	x											

[illegible]

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ											ទឹកនៃង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	
ធ្វើការវិញ្ញាបនបត្រ ដូចជា៖ មានទាប្រឹក គោ និងក្របី សម្រាប់បុរស និងស្រី គ្រាន់ជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារ។	ដោយក្នុង១ថ្ងៃ អោយចំនីមួយដងទៅ២ដង ប្រភេទមានស្រទាប ប្រភេទល្អ ចិញ្ចឹមនៅស្រែ និងនៅក្នុងភូមិ។													
	គោក្របី គោក្របីចិញ្ចឹមពេញមួយឆ្នាំ ដោយប្រើលេងពេលត្រឹម ពេលល្ងាចទៅតាមកមរវិញដោយដេញដោយចូលមកផ្ទះវិញ។	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ទូលពូលដំ និងស្រែវែងគោ ក្របីនៅត្រាំត្រាំង ក្រាញ់ ត្រាំងកោះ/ត្រាំង ត្រាំង និងស្រែលាង។
ក្រៅពីនេះសហគមន៍មួយចំនួនតូចក៏ប្រកបមុខរបរលក់ដូរបន្តិចបន្តួច ដូចជា អំបិល ប៊ីចេង នំ ទឹកក្រូច សាំង ម៉ាស៊ូត...។														
នេសាទ														
សំណាញ់	សំណាញ់ត្រីវៀល ភាគច្រើនអាចចាប់ត្រីមួយចំនួន ដូចជា ត្រីវៀល ត្រីស្លាត កូនត្រី អណ្តែង និងកូនត្រីឆ្កែ។	x				x				x				អូប្រោះថ្លៃ អូរចេត ត្រាំងក្រាញ់ និងកុតប្រី តាមដងទន្លេស្រែពក
	សំណាញ់ឡាក (ប្រភេទសំណាញ់ត្រីឡាត) ភាគច្រើនបង់នៅតាមអន្លូងកាំងជ័រ និងអាចចាប់ត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីរ ត្រីក្រសក់ ត្រីព្រួល ត្រីក្អែក ត្រីឆ្កែ ត្រីឆ្កែ ត្រីមាសជាដើម។		x	x	x	x				x				
	សំណាញ់ប្រយ័ង សំណាញ់ប្រភេទនេះ អាចចាប់បានត្រីប្រាំបួន ត្រីឆ្កែ ត្រីស្លាត ត្រីក្រសក់ ត្រីក្រហម ត្រីក្រហម ត្រីក្រហម។													តាមថ្ម គុម្ពអណ្តែង គុម្ពដី
មង	មងអាចចាប់បានត្រីក្អែក ត្រីប៉ាវ៉ា ត្រីឆ្កែ ត្រីប៉ាសាអី ត្រីក្រសក់ ត្រីគុលរាំង ត្រីកេះ។		x	x	x	x				x				ទន្លេស្រែពក

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ												ទីកន្លែង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២		
សន្ទូច	សន្ទូចរនង សម្រាប់ដាក់យកត្រីខ្សា, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីឆ្កែរ។ នុយសម្រាប់សន្ទូចមានដូចជា ជន្លេន ផ្អែលា, ខ្យង ចង្រិត និងពេលខ្លះ សាច់ត្រី។	x	x									x	x		
	សន្ទូច បណ្តែត ប្រើនុយដូចជា ផ្អែលា និងសាច់ត្រី) ភាគច្រើនត្រីដែលដាច់សន្ទូចមាន ត្រីពោធិ៍ និងត្រីប្រា...								x	x	x				
	សន្ទូចបោះ ត្រីដែលដាច់សន្ទូចមាន ត្រីខ្សា ត្រីឆ្កាំង ត្រី កញ្ចក់ក្រហម ត្រីប្រា ត្រីកេះ ត្រីស្លាប មានត្រីកញ្ចុះ...។	x	x	x	x	x								ស្រះជ្រៅ	
	សន្ទូចវាត់ ប្រភេទត្រី ដែលស៊ីសន្ទូចនេះ មានដូចជា ត្រីឆ្កែ ត្រីឆ្កាំង ត្រីឆ្កិន ប្រភេទត្រីស្រកាតូច សន្ទូចរៀម						x	x	x	x	x				
	ត្រីដែលស៊ីសន្ទូចប្រភេទនេះមានដូចជា ត្រីស្លាបមាន ត្រីកញ្ចុះ ត្រីចក់។							x	x	x	x				
	សន្ទូចបង្ក (បង្កសន្ទូច) ត្រីដែលស៊ីសន្ទូច ប្រភេទនេះ រួមមាន ត្រីអណ្តែង ត្រីស្រីស្រីឆ្កាំង, និងត្រីខ្លីង	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	អូរតូចៗ និង ព្រំពាំង	
	សន្ទូចបង្ក ត្រីខ្សា, ត្រីប្រា, ត្រីពោ, ត្រីស្លាត់ធំៗ កូនត្រីអណ្តែង ត្រីប្រាញ់, (នុយ កង្កែប)។	x	x									x	x		
	ត្រីរៀល បង្ក ត្រីអាចម៍កុក	x	x	x	x										
	ចាប់បាន គន្ធាយ រំលេក អណ្តែតសង្កល ត្រីខ្សា ត្រីស្លាត់ ត្រីក្រសក់ ត្រីឆ្កែរ ត្រីមាស	x					x	x	x	x	x	x	x	ទន្លេ	

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្របច្ចេកទេស	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ										ទីកន្លែង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២
ផ្ទះ	ត្រី ក្បាន ត្រីអណ្តូង ត្រីវស់...។										X	X	X
លាយ	ត្រី ក្បាន ត្រីអណ្តូង ត្រីវស់...។							X	X	X	X	X	X
ឈ្មោះ	កម្ពស់ ក្តាម ខ្យង ត្រីប្រាំ ត្រីប្រាំបី ត្រីវស់ ត្រីអណ្តូង ត្រីឆ្មុញ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ប្រមូលផលអនុវត្តបច្ចេកទេស													
ប្រែប្រួល	ផ្លែឈើ												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	ផ្លែឈើ												
ប្រែប្រួល	ផ្លែឈើ												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
ប្រែប្រួល	ផ្លែឈើ												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
ប្រែប្រួល	ផ្លែឈើ												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												
	– ផ្លែ ក្រូច												

សកម្មភាពវិញ្ញាបនបត្រប្រចាំថ្ងៃ	ប្រភេទ/លម្អិត	កាលបរិច្ឆេទ											ទីកន្លែង	
		១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	
ទន្លេប្រាំងទន្លេ	ខ្មៅ, ក្រំ			X	X									ជួរច្រាល ជួរជើង
	បន្លំ	X	X											កែងថ្ម
	- ផ្កាអណ្តែង													
	ប្រភេទត្រពាំង													អូរចេក អូរព្រះផ្អែក និងតាមជងទន្លេស្រែ
	- ត្រពាំងស្រក, ត្រពាំងឫស្សីព្រៃខ្លី, ត្រពាំងឫស្សីព្រៃ, ត្រពាំងឫស្សីក្រវីប និង ត្រពាំងឫស្សីព្រៃច					X	X	X	X					ពក
វាលស្រែ	ម្លូម					X	X	X	X	X	X	X	X	
	ក្តាម ខ្យង							X						ស្រែជើងភូមិ ស្រែព្រះផ្អែក និងស្រែពេ
	កង្កែប ហ៊ីង និងត្រីផងដែរ					X	X							តាមស្រែ និង អូរ ល្វា
ការបរិច្ចាគសត្វ														
	អណ្តើក											X	X	ទួល ល្វា និង ភ្នំរឹង
	- សង្កល ព្រិច ...ធ្វើម្ហូប សេក កង្កែប ដុះ													និងព្រៃអូរផ្អែក
	ត្រកូត					X	X							ព្រៃអូរផ្អែក
	ឈ្នួស	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ទួលស្រែវែង
	ជ្រូកព្រៃ	X	X	X	X	X	X	X	X	X				ទួលល្វា និង ភ្នំរឹប
	សាវការកែ			X	X	X	X							អូរពោធិ៍សាត់ ស្រែធំ
ឃុំ	សាវការកែ			X	X	X	X							ជុំវិញភូមិ
	- ឃុំខែចេត្រ													
	- ឃុំងារ			X	X									អូរផ្អែក
													X	

ក្រៅពីការងារទាំងនេះ យើងក៏បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចជាពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗ និងចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗជាមួយ អាជ្ញាធរភូមិ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។

Kbal Romeas Village SEASONAL LIVELIHOOD CALENDAR

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Agriculture Upland rice farming There is no need to do land preparation (ploughing and harrowing) or raise seedlings. Farmers simply need to do weeding. After weeding, rice seed can be directly planted. Normally, farmers rotate rice farming land every 2-3 years. Within the upland rice field, farmers also grow pumpkins, bottle gourds, luffa gourds, lemon grass, Romdenh (<i>Probably Planchonella obovate</i>), chili, eggplants, long beans, and cucumbers in the burned areas or at the base of mounds	New land preparation – Slashing wood shrubs – Burning – Weeding Planting and Harvesting (*weeding before and 15–20 days after planting until the booting stage) Srov Kantrup An early-maturing variety (two and-a-half months). Grain is short, soft and has a good flavor.		x	x	x									Roeng and Kuy Mountain
	Srov Kavet A medium-maturing variety (three months). Planted in June and harvested in September.							x Planting						
	Srov Kantrey A medium-maturing variety, as with Srov Kavet (three months). Farmers generally grow these three varieties because the grains are soft, fragrant and delicious.							x Planting				x Harvesting		
Lowland rice When land is not being used, it is used for grazing livestock such as cows.	Land Preparation Cutting and burning stubble (If left long) cut stubble and gather it at the center of rice field for burning Ploughing To expose soil to the sun and to kill weeds					x								Srae Phum Kbal Romeas, Srae Rum Pe, Srae Preah Pha Ek
	Raising seedlings About 2 weeks after land preparation, we start raising seedlings, normally next to the rice field.						x							
	Planting seedlings and harvesting Srov Neang Tey and Sen Pidor Early-maturing varieties (two-and-a-half months)							x Planting						
													x Harvesting	

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rumduol, Phka Sla, Phka Malis Medium-maturing varieties. The grains are soft, fragrant, and have a good flavor when cooked.								x Planting		x Harvesting			
	Srov Sken Medium-maturing variety. The grains are hard when cooked and not delicious. Farmers grow it because it gives a good yield and can grow in a range of soil types.								x Planting		x Harvesting			
	Srov Neang Noy A late-maturing variety (five months). Grains are not soft, and expand when cooked. The tillers are rigorous and it gives a good yield.								x Planting		x Harvesting			
Farming	Cashew (a cash crop) Weeding (depends on weed density) Collecting cashew fruits	x	x	x	x						x			
	Cassava (a cash crop) – For new land, clear and burn land – Planting – Weeding – Harvest		x	x	x	x				x	x	x	x	
	Pak choy (ver.) – Farmers need to raise a soil bed, and apply ash to the prepared soil, establishing a nursery above the ground for raising seedlings. – 15–20 days after seeding, farmers uproot seedlings and transplant them into the soil bed. – After transplanting, farmers need to take care of the crop including application of compost, watering, weeding and cultivating the soil.	x	x	x										
Kitchen gardens	Morning glory – Farmers need to raise a soil bed, and apply ash to the prepared soil, and two days later, the seed can be planted. Before planting, seed needs to be soaked in warm water for two hours, and then taken away to be properly dried. The garden is watered before and after planting. With proper care	x	x	x		x	x	x		x	x	x		

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(watering, weeding, stirring up the soil, fertilization), farmers can harvest two to three times a year.													
	Other popular vegetables to plant eggplants garlic chili ginger turmeric cucumbers long beans	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x			x	
Animal raising For family consumption as well as for sale to generate additional income to support livelihoods.	Chickens, ducks and pigs – Raised in a pen or are free-range. For pigs, sometimes they are tied with wire. They are fed once or twice a day. – Local chicken breeds, broiler ducks, and locally bred pigs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	In rice fields and in the village.
	Cattle – Released in the morning for free grazing, and in the evening, villagers bring them back to their pen.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tuol Pou Long and Srae Veng Ko. Cattle are in Tram Trapeang Tram, Trapeang Kor Koh/Trpeang Tbeing, Srae Laing
Other than agricultural activities, some community members run small businesses such as selling salt, MSG, cake, soft drink, gasoline, diesel etc.														
Fishing (Scientific names of fish are taken from "Sesan River Fisheries Monitoring in Ratanakiri Province, Northeast Cambodia: Before and After the Construction of the Yal Falls Dam in the Central Highlands of Viet Nam (2005)".														
Cast net	Trey Riel cast net This is used to catch Trey Riel - <i>Henicorhynchus lobatus</i> , Trey Slat - <i>Notopterus notopterus</i> , small Kaun Trey Andaing - <i>Clarias batrachus</i> , and small Kaun Trey Chhlang - <i>Hemibagrus nemurus</i>).	x	x	x	x								x	O Preah Pha Eik, O Kantrum, O Rumchek, Trapeang Kranh and Kot Bou Tunle

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Lak cast net Fish caught with this net include Trey pawa mook pee - <i>Bangana behri</i> , Trey trawsak - <i>Probarbus jullieni</i> , Trey Pruol- <i>Cirrhinus microlepis</i> , Trey kaek - <i>Morulus</i> spp. Trey Chhpin - <i>Hypsibarbus</i> spp., Trey khlar - <i>Colus undecimradiatus</i> , Trey Romeas - <i>Osphronemus exodon</i>		x	x	x									Among rocks, Kum Andeng, and inside green water plant bushes (Kum Rey).
	Proyong cast net This net can be used to catch Trey Phka Kduoch, Trey Chhpin - <i>Hypsibarbus</i> spp., Trey Slat - <i>Notopterus notopterus</i> , Trey trawsak - <i>Probarbus jullieni</i> , Trey chrakain - <i>Puntioplites falcifer</i> , Trey kahe - <i>Barbonymus schwanenfeldii</i>			x	x									
Gillnet	- This net can be used to catch Trey kaek - <i>Morulus</i> spp., Trey pawa - <i>Labeo erythropterus</i> , Trey Chhpin - <i>Hypsibarbus</i> spp., Trey Pasa ee - <i>Mekongina erythrospila</i> , Trey trawsak - <i>Probarbus jullieni</i> , Trey Kol Reang - <i>Catlocarpio siamensis</i> -, Trey Kes - <i>Micronema</i> spp.		x	x	x									Srepok River
	Santouch Ronoang - This can be used to catch Trey Khya - <i>Hemibagrus wyckoides</i> , Trey Chhlang - <i>Hemibagrus nemurus</i> , Trey Klang hay - <i>Belodontichthys truncates</i> , Trey Chhdaur - <i>Channa micropeltes</i> . - Baits used include earthworms, a kind of fig (probably <i>Ficus racemosa</i> L.) and snails.	x	x									x	x	
Fishing line (Santouch)	Santouch Ban Deith - Fish caught include Trey Po - <i>Pangasius lamarudii</i> , Trey Pra - <i>Pangasius hypophthalmus</i> . - Baits include a kind of fig (probably <i>Ficus racemosa</i> L.) fruit and fish flesh.								x	x				

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Santouch Bos – These can be used to catch Trey Khya - <i>Hemibagrus wyckoides</i>, Trey Chhlang - <i>Hemibagrus nemurus</i>, Trey Kanh Chrouk Kraham - <i>Boia modesta</i>, Trey Pra - <i>Pangasius hypophthalmus</i>, Trey Kes - <i>Micronema</i> spp., Trey Slab Moan - <i>Kryptopterus cryptopterus</i>, Trey Kanchos - <i>Mystus</i> spp.	x	x	x	x	x									Deep pools
	Santouch Vath – This can be used to catch Trey chhdaur - <i>Channa micropeltes</i>, Trey Chhlang - <i>Hemibagrus nemurus</i>, Trey Chhpin - <i>Hypsibarbus</i> spp., and other small fish.					x		x	x	x					
	Santouch Riem – This can be used to catch Trey Slab Moan, Trey Slab Moan - <i>Kryptopterus cryptopterus</i>, Trey Chek Tum - <i>Bagrichthys macropterus</i>.						x	x	x	x	x				
	Santouch Bangkoang: – This can be used to catch Trey Andeng - <i>Clarias batrachus</i>, Trey Raws - <i>Channa marulius</i>, Trey Chhlang - <i>Hemibagrus nemurus</i>, Trey khoeung - <i>Mastacemblus</i> spp.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Small streams and ponds.
	Santouch Bangkokai: – This can be used to catch Trey Khya,- <i>Hemibagrus wyckoides</i>. Trey Pra - <i>Pangasius hypophthalmus</i>, Trey Po - <i>Pangasius sanitwongsei</i>, Trey stuak - <i>Wallago leeri</i>, Fingerlings of <i>Clarias</i> spp., of <i>Anabas testudineus</i>, and frogs are used as bait.	x	x									x	x		
Tom	– This can be used to catch Trey Riel - <i>Henicorhynchus lobatus</i>, Trey Bang kuoy - <i>Luciosoma bleekeri</i>, Trey Archkok - <i>Labiobarbus siamensis</i>.	x	x	x	x										

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Chann	– This can be used to catch Kantheay - <i>Trionyx ornatus</i> , turtles, Trey Khya - <i>Hemibagrus wyckiioides</i> , Trey stuak - <i>Wallago leerii</i> , Trey tawsak - <i>Probarbus jullieni</i> , Trey chhdaur - <i>Channa micropeltes</i> , Trey Romeas - <i>Osphronemus exodon</i> .	x					x	x	x	x	x	x	x	Rivers	
Thnous	– Fish caught using this gear include Trey Ksan - <i>Channa gachua</i> , Trey Angdeing - <i>Clarias</i> spp., Trey Raws - <i>Channa marulius</i> - etc.									x	x	x	x	O Rumchek, O Kranh	
Leay	– Fish caught using this gear include Trey Ksan - <i>Channa gachua</i> , Trey Andaing - <i>Clarias batrachus</i> , Trey Raws - <i>Channa marulius</i> etc.							x	x	x	x	x	x	O Srae Veng, O Kbal Romeas	
Wedge-Shaped Scoop basket (Chhnieng)	– This can be used to catch shrimps, crabs, snails, Trey Changwa - <i>Rasbora</i> spp., Trey Kranh - <i>Anabas testudineus</i> , Trey Raws - <i>Channa marulius</i> , Trey Andaing - <i>Clarias batrachus</i> , Trey Chhlonh - <i>Macrognathus siamensis</i> .	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	Trapeang Kranh and Trapeang Kbal Romeas	
Collecting of Non-Timber Forest Products															
Forest	Fruit													Roeng and Bey Mountain	
	– Phnhiev (probably <i>Baccaurea ramiflora</i>)				x	x									
	– Kuy(probably <i>Willughbeia edulis</i>)				x	x									
	– Pong Ror (probably <i>Schleicheria oleosa</i>)			x	x										
	– Sramor (<i>Terminalia chebula</i>)														
	– Nhor (<i>Morinda citrifolia</i>)														
	Dry Resin													Srae Thom, Tuol Trapeang Thmor, Roeng Mountain	
	– Chor Chong			x	x										
	– Chor Sa Ong			x	x										
	Liquid resin														
	– Villagers make holes in the trunks of Trach (probably <i>Dipterocarpus crispalatus</i>) and Chheu Teal (probably <i>Dipterocarpus alatus</i>), then set them on fire for five minutes. After putting out the fire, they can collect the resin from the trees. Villagers use it to produce torches for sale.	x	x											Kot Bou	

Livelihood activities	Type/details	Months												Locations*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
River, Riverbank	Rattan and other vines – water rattan, mountain rattan, wooden rattan and chicken-dunk rattan					x	x	x						Prey Kranh and Prey Roeng
	Mushrooms – Phset Rognea											x	x	Whole forest
	– Phset Kngok					x	x							Tuol Phlong
	– Phset Pok (Phset Pok and Phset Ambos).					x	x							Prey Kranh and Prey Roeng
	Snails, Mussels			x	x									Chou Kranh, Chou Poak
Rice field Besides obtaining rice for year-round consumption, rice fields are also a habitat for crabs, snails, chubby frogs and fish.	Vegetables – Andeng flowers	x	x									x	x	Kaing Thmor
	Bamboo shoots – Tompaing Srok, Tompaing Russey Prey Khley, Tompaing Russey Prey, Tompaing Russey Khseb, and Tompaing Russey Prich					x	x	x	x	x				O Rumchek, O Preah Pha Eik and along the Sesan River
	Ma Om (probably <i>Limnophila aromatica</i>)					x	x	x	x	x	x	x	x	
	Snails, crabs						x							Srae Cheung Phum, Srae Preah Pha Eik and Srae Rumpe
	Frogs and chubby frogs					x	x							In rice fields and O Lvier
Hunting														
	Turtles - Sangkoal, Prich, Sek, Kokou, Dos											x	x	Tuol Phlung, Roeng Mountain and Prey O Phdoa
	Tror Kuot (probably <i>Varanus bengalensis nebulosus</i>)					x	x							Prey O Phdoa, Prey Raung Yuon
	Chhlous (probably <i>Tragulus javanicus</i>)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tuol Srae Veng, Tuol Phlung and Bey Mountain
	Wild pigs		x	x	x	x	x	x	x	x				O Raung Yuon, Srae Thom
	Sarika Keo (probably <i>Acridotheres javanicus</i>)			x	x	x	x							Around villages
	Bees (Honey) - Khnum Khier Chet - Khnum Rongea			x	x									O Phdoa
													x	

*In the locations, Srae indicates a rice field, O indicates a stream, and Trapeang indicates a pond.

Besides the above, community members are engaged in social activities such as festivals, and participate in meetings with village authorities and civil society organizations.

Appendix 2

Examples of Kbal Romeas Village Fish

Sample

Name in Khmer

In the Roman alphabet

Name in Bunong

In the Roman alphabet

Scientific Name



ត្រីកញ្ចប់ច្រាស Trei Kachanh Chras
ការង្រាល Kar Ngreal
Parambassis apogonoides



ត្រីកញ្ចប់ក្រហម Trei Kanh Chrouk Kraham
ការឆរ Kar Chhor
Botia modesta



ត្រីកញ្ចប់ Trei Kanchos.
ការត្នៃ Kar Ra Klae
Mystus spp.



ត្រីកញ្ចប់ Trei Kantrawb
ការត្រប់ Kar Trop
Pristolepis fasciata



ត្រីការហែ Trei Kahe
ការបិស Kar Bis
Barbonymus schwanenfeldii



ត្រីកែសប្រាក់ Trei Kes Prak
ការកែ Kar Keh
Kryptopterus spp



ត្រីកែក Trei Kaek
ការតុងណាត Kar Tong Na At
Morulus spp.



ត្រីកែ Trei Kes
ការកែ Kar Keh
Micronema spp.



ត្រីក្រាញ់ Trei Kranh
ការកាញ់ Kar Kanh



ត្រីក្លាំងហាយ Trei Klang Hay
ការឡាំងហា Kar Lang Hay
Belodontichthys truncatus



ត្រីក្សាន Trei Ksan,
ការញួយ Kar Nho Chuy
Channa gachua



ត្រីខ្លា Trei Khlar
ការយៅ Kar Yeav
Coius undecimradiatus



ត្រីខ្យា Trei Khya
ការកកុង Kar Kakong
Hemibagrus wyckiioides



ត្រីខ្លឹង Trei Kchoeung.
ការពិ Kar Pis
Mastacemblus spp.



ត្រីគុលរាំង Trei Kol Reang

Catlocarpio siamensis



ត្រីច្រកែង Trey Chrakaing

Puntioplites falcifer




ត្រីច្រវា Trey Changwa, Chrava
ការម្យាច Kar Myach

Rasbora spp.



ត្រីឆ្កោក(មូល) Trey Chhkoc (Moul)

Cyclocheilichthys enoplos



ត្រីឆ្កោរ Trey Chhdaur.

ការចូក Kar Chok

Channa micropeltes



ត្រីឆ្កិន Trey Chhpin

ការវាណាលា Kar Ra Na Lae

Hypsibarbus spp.



ត្រីឆ្កូញ Trey Chhlonh

ការវាលោញ Ka Ra Loan

Macrogynathus siamensis



ត្រីឆ្កាំង Trey Chhlang

ការឡាំង Kar Lang

Hemibagrus nemurus



ត្រីត្រសក់ Trey Trawsak

ការប៉ុង Kar Pong

Probarbus jullieni



ត្រីត្រសេក Trey Trawsek

ការឆៀល Kar Chheal



ត្រីបង្កួយ Trey Bang kuoy

Luciosoma bleekeri



ត្រីប្រា Trey Pra

ការប្រា Kar Pra

Pangasius hypophthalmus



ត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីរ Trey pawa mook pee

កាតាយ៉ូកពុក Kar Ta Yok Puk

Bangana behri



ត្រីប៉ាសាឌី Trey Pasa ee

ការប៉ាសាឌី Kar Pasa Y

Mekongina erythrospila



ត្រីផ្កាកូច Trey Phka Kduoch



ត្រីពោ Trey Po

ការឆាពៅ Kar Chha Paov

Pangasius larnaudii



ត្រីព្រួល Trey Pruol
ការព្រួល Kar Preal
Cirrhinus microlepis



ត្រីរមាស Trey Romeas.
ការត្រើង Kar Ta Eung
Osphronemus exodon



ត្រីរៀល Trey Riel
ការត្រាល Kar Nreal
Henicorhynchus lobatus



ត្រីរស់ Trey Raws
ការត្រួល Kar Tuol
Channa marulius



ត្រីស្លក់ Trey stuak
—
Wallago leeri



ត្រីស្លាត Trey Slat
ការត្រឡាត Kar Ralat
Notopterus notopterus



ត្រីស្លាបម៉ាន់ Trey Slab Moan
ការណាណ Kar Nan
Kryptopterus cryptopterus



ត្រីអណ្តែង Trey Andaing
ការកាញ់ Kar kanh
Clarias batrachus



ត្រីអាចម៍កុក Trey Archkok
ការត្រាលកុក Kar Nreal Kok
Labiobarbus siamensis



អង្កង់ Antung
ន្ទុង Ntung
Monopterus albus

Scientific names of fish are from "Sesan River Fisheries Monitoring in Ratanakiri Province Northeast Cambodia: Before and After the Construction of the Yali Falls Dam in the Central Highlands of Viet Nam" (Ian G. Baird and Meach Mean 2005).

Photos: Fumiko Takahashi, Rithy Pruch, Samnang Dam, Sarin Thong, 3S Rivers Protection Network

Appendix 3

Examples of Kbal Romeas Village Fishing Gear

សំណាញ់ (Samnanh) Cast Net



1) សំណាញ់ត្រីរៀល (Samnanh Trey Riel) Trey Riel Cast Net

Generally has a mesh size of 2.5 to 3 cm. This is used to catch Trey Riel- *Henicorhynchus lobatus*, Trey Slat- *Notopterus notopterus*, Kaun Trey Andaing- small *Clarias batrachus*, and Kaun Trey Chhlang- small *Hemibagrus nemurus*.

December to May.

សំណាញ់ត្រីរៀល ភាគច្រើនមានក្រឡាចន្លោះពី២.៥-៣ សង់ទីម៉ែត្រ។ សំណាញ់នេះ ប្រើដើម្បីចាប់ត្រីរៀល (*Henicorhynchus lobatus*) ត្រីស្លាត (*Notopterus notopterus*) កូនត្រីអណ្តែង (small *Clarias batrachus*) និងកូនត្រីឆ្កែ (small *Hemibagrus nemurus*) នៅ ចន្លោះខែធ្នូដល់ខែឧសភា។



2) សំណាញ់ឡាក (Samnanh Lak) Lak Cast Net



A mesh size of 12 to 15 cm. It is used to catch fish in deep pools, Kaing Choir. Fish caught with this net include Trey pawa mook pee- *Bangana behri*, Trey trawsak- *Probarbus jullieni*, Trey Pruol- *Cirrhinus microlepis*, Trey kaek- *Morulus* spp., Trey Chhpin- *Hypsibarbus* spp., Trey khlar- *Coius undecimradiatus*, Trey Romeas- *Osphronemus exodon*.

February to May.

សំណាញ់ឡាក មានក្រឡាចន្លោះពី ១២ ដល់ ១៥ សង់ទីម៉ែត្រ។ សំណាញ់នេះ ប្រើដើម្បីចាប់ត្រីតាមអន្លង់ជ្រៅៗ កាំងជ័រ។ សំណាញ់នេះ អាចចាប់បានប្រភេទត្រីមួយចំនួន ដូចជាត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីរ(*Bangana behri*) ត្រីត្រសក់


(*Probarbus jullieni*), ត្រីព្រល (Cirrhinus microlepis) ត្រីក្អក (Morulius spp.) ត្រីឆ្អិន (*Hypsibarbus* spp.) ត្រីខ្លា (*Coius undecimradiatus*) ត្រីរមាស (*Osphronemus exodon*) ក្នុងចន្លោះខែ កុម្ភៈ ដល់ខែមេសា។

3) សំណាញ់ប្រយ៉ុង (Samnanh Proyong) Proyong Cast Net

A mesh size of 5 to 7 cm. This can be used to catch Trey Phka Kduoch, Trey Chhpin- *Hypsibarbus* spp., Trey Slat- *Notopterus notopterus*, Trey trawsak- *Probarbus jullieni*, Trey chrakaing- *Puntioplites falcifer*, Trey kahe- *Barbonymus schwanefeldii*. This proyong cast net is used between March and April in areas where there are rocks, Andeng bushes and Rey bushes..

សំណាញ់ប្រយ៉ុង មានក្រឡាចន្លោះពី ៥ ដល់ ៧ សង់ទីម៉ែត្រ។ សំណាញ់ប្រភេទនេះ ប្រើដើម្បីចាប់ប្រភេទ ត្រីផ្កាក្នុង ត្រីឆ្អិន (*Hypsibarbus* spp.) ត្រីស្លាត (*Notopterus notopterus*) ត្រីត្រសក់ (*Probarbus jullieni*) ត្រីច្រកែង (*Puntioplites falcifer*) ត្រីការហែរ (*Barbonymus schwanefeldii*) ចន្លោះខែមីនា ដល់ខែមេសា តាមថ្ម គុម្ពអណ្តែង គុម្ពដី។

២១ (Moang) Gill Net



3S Rivers Protection Network



A mesh size of 3 to 15 cm. This can be used to catch Trey kaek- *Morulius* spp., Trey pawa- *Labeo erythropterus*, Trey Chhpin- *Hypsibarbus* spp., Trey Pasa ee- *Mekongina erythrospila*, Trey trawsak- *Probarbus jullieni*, Trey Kol Reang- *Catlocarpio siamensis*, Trey Kes- *Micronema* spp.. The fishing season is from February to May because during this time villagers are not busy with rice farming.

មង មានក្រឡា ចន្លោះពី ៣ ដល់ ១៥ សង់ទីម៉ែត្រ។ ឧបករណ៍នេះ ប្រើដើម្បីចាប់ប្រភេទត្រីក្អក (*Morulius* spp.) ត្រីប៉ារ៉ា (*Labeo erythropterus*) ត្រីឆ្អិន (*Hypsibarbus* spp.) ត្រីប៉ាសេអ៊ី (*Mekongina erythrospila*) ត្រីត្រសក់ (*Probarbus jullieni*) ត្រីគុលរាំង (*Catlocarpio siamensis*) ត្រីកេស (*Micronema* spp.)។ ឧបករណ៍នេះ ភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើនៅចន្លោះខែកុម្ភៈ ដល់ខែមេសា ព្រោះវាជាខែដែលអ្នកភូមិទំនេរពីការធ្វើស្រែ។

សន្ទូច (Santouch) Fishing Line

1) សន្ទូចរនង (Santouch Ronong) Hook Long Line

This can be used to catch Trey Khya- *Hemibagrus wyckioides*, Trey Chhlang- *Hemibagrus nemurus*, Trey Klang hay- *Belodontichthys truncates*, Trey Chhdaur- *Channa micropeltes*. Baits used include earthworms, *Ficus carica* fruit and snails.

សន្ទូចរនង ប្រើដើម្បីចាប់ប្រភេទត្រីខ្សា (*Hemibagrus wyckioides*) ត្រីឆ្កាំង (*Hemibagrus nemurus*) ត្រីខ្លាងហាយ (*Belodontichthys truncates*) ត្រីឆ្កោ (*Channa micropeltes*)។
នុយដែលគេប្រើជាមួយសន្ទូចរនងនេះ រួមមានសត្វជន្លេន ផ្លែល្វា (*Ficus carica* fruit) និងសត្វខ្យង។

2) សន្ទូច បណ្តែត (Santouch Ban Deith) Ban Deith Fishing Line

This fishing line uses a wire of about 70 cm in length with an attached float (plastic bottle, e.g. water bottle).

Baits include *Ficus carica* fruit and fish flesh. Fish caught include Trey Po- *Pangasius larnaudii*, Trey Pra- *Pangasius hypophthalmus*.

សន្ទូចបណ្តែតនេះ គេប្រើខ្សែ ប្រវែងប្រមាណ ៧០ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលគេចងភ្ជាប់ជាមួយកម្សួល (អាចជាដបផ្លាស្ទិក ដូចជាដបទឹកសុទ្ធ ឬទឹកក្រូចជាដើម)។

ប្រភេទនុយដែលគេប្រើជាមួយសន្ទូចបណ្តែតនេះ រួមមានផ្លែល្វា (*Ficus carica* fruit) និងសាច់ត្រី។ ត្រីដែលជាប់សន្ទូចនេះ ភាគច្រើនជាត្រីពោធិ៍ (*Pangasius larnaudii*) ត្រីប្រា (*Pangasius hypophthalmus*)...។

3) សន្ទូចបោះ (Santouch Bos) Cast Hand Long Line

A long wire of 10 to 15 m is used. Next to the hook, a leader is tied to the fishing line. Earthworms are used as bait. These can be used to catch Trey Khya- *Hemibagrus wyckioides*, Trey Chhlang- *Hemibagrus nemurus*, Trey Kanh Chrouk Kraham- *Botia modesta*, Trey Pra- *Pangasius hypophthalmus*, Trey Kes- *Micronema* spp., Trey Slab Moan- *Kryptopterus cryptopterus*, Trey Kanchos- *Mystus* spp.. This hand cast long line is used in places where there is deep water or in a deep pool.

សន្ទូចបោះ គេប្រើខ្សែវែងពី១០-១៥ ម៉ែត្រ។ នៅជិតផ្លែសន្ទូច មានចង់សំនរ ដើម្បីអោយវាមានទំងន់ធ្ងន់ ល្មម។ នុយដែលប្រើជាមួយសន្ទូចប្រភេទនេះ គឺជន្លេន ។ ត្រីដែលជាប់សន្ទូចនេះ មានត្រីខ្សា (*Hemibagrus wyckioides*) ត្រីឆ្កាំង (*Hemibagrus nemurus*) ត្រីកញ្ជ្រូក (*Syncrossus beauforti*) ត្រីប្រា (*Pangasius hypophthalmus*) ត្រីកេស (*Micronema* spp.) ត្រីស្លាបមាន់ (*Kryptopterus cryptopterus*) ត្រីកញ្ចុះ (*Mystus* spp)..។ គេដាក់នៅកន្លែងទឹកជ្រៅឬអន្លង។

4) សន្ទូចវាត់ (Santouch Vath) Vath Fishing Line

This line is made using a 2m-long bamboo stem and a 2m-long wire. This can be used to catch Trey chhdaur- *Channa micropeltes*, Trey Chhlang- *Hemibagrus nemurus*, Trey Chhpin- *Hypsibarbus* spp., and other small fish. Earthworms are used as bait.

សន្ទូចវ៉ាត់ មានដងធ្វើពីដើមឫស្សីប្រវែង ២ម៉ែត្រ និងមានខ្សែប្រហែល២ម៉ែត្រដែរ។ ប្រភេទត្រី ដែលស៊ីសន្ទូចនេះ មានដូចជា ត្រីឆ្កែ (*Channa micropeltes*) ត្រីឆ្កាំង (*Hemibagrus nemurus*) ត្រីឆ្អិន (*Hypsibarbus* spp.) និងប្រភេទត្រីតូចៗមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ សត្វជន្លេន ត្រូវប្រើជានុយជាមួយឧបករណ៍ប្រភេទនេះ។

5) សន្ទូចរៀម (Santouch Riem) Riem Fishing Line

Villagers cut bamboo branches with 7 to 8 small branches and tie the fishing line to the branches. This can be used to catch Trey Slab Moan- *Kryptopterus kryptopterus*, Trey Kanchum Sor, Trey Chek Tum- *Bagrichthys macropterus*.

សន្ទូចរៀម គេកាប់មែកឬស្សី ដែលមានមែកតូចៗពី ៧-៨ មែក រួចចងសន្ទូចដាក់តាមមែកឬស្សីនីមួយៗ។ ត្រីដែលស៊ីសន្ទូចប្រភេទនេះមានដូចជា ត្រីស្លាបមាន់ (*Kryptopterus kryptopterus*) ត្រីកញ្ចុំជ័រ ត្រីចេកទុំ (*Bagrichthys macropterus*)។

6) សន្ទូចបង្កង់ (Santouch Bangkoang) Bangkoang Fishing Line

Besides using this to catch fish in a river, villagers also use it to catch fish in small streams and ponds. It can be used to catch Trey Andaing- *Clarias batrachus*, Trey Raws- *Channa marulius*, Trey Chhlang- *Hemibagrus nemurus*, Trey kchoeung- *Mastacemblus* spp.. Earthworms are used as bait. This bangkoang fishing line can be used the whole year round.

សន្ទូចបង្កង់ ក្រៅពីដាក់ នៅទន្លេអ្នកភូមិក៏អាចដាក់តាមអូរ និងត្រពាំងផងដែរ។ ត្រីដែលស៊ីសន្ទូចនេះ រួមមានត្រីអណ្តែង (*Clarias batrachus*) ត្រីរីស (*Channa marulius*) ត្រីឆ្កាំង (*Hemibagrus nemurus*) ត្រីខ្លីង (*Mastacemblus* spp.)។ សត្វជន្លេន ត្រូវប្រើជានុយជាមួយឧបករណ៍ប្រភេទនេះ។ យើងអាចធ្វើការ នេសាទបានពេញៗឆ្នាំ។

7) សន្ទូចបង្កែ (Santouch Bongkai) Single Hook Set Pole and Line

This can be used to catch Trey Khya- *Hemibagrus wyckioides*, Trey Pra- *Pangasius hypophthalmus*, Trey Po- *Pangasius sanitwongsei*. Trey stuak- *Wallago leeri*. Fingerlings of *Clarias* spp., of *Anabas testudineus*, and frogs are used as bait.

សន្ទូចបង្កែ ប្រើដើម្បីចាប់ត្រីខ្សា (*Hemibagrus wyckioides*) ត្រីប្រា (*Pangasius hypophthalmus*) ត្រីពោ (*Pangasius sanitwongsei*) ត្រីស្លាក់ (*Wallago leeri*)។ កូនត្រីតូចៗប្រភេទត្រីអណ្តែង ត្រីក្រាញ់ និងកូនកង្កែប ត្រូវប្រើជានុយជាមួយឧបករណ៍ប្រភេទនេះ។

តុម (Tom) Vertical vase trap for small fish



A fishing implement made of bamboo. It is placed on riversides, in sand, small streams, water pools of 0.5m in depth. Rice mixed with rice bran is used as bait. This can catch Trey Riel - *Henicorhynchus lobatus*, Trey Bangkuoy- *Luciosoma bleekeri*, Trey Ach kok- *Labiobarbus siamensis*.

តុមជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលធ្វើពីឫស្សី។
គេអាចដាក់តុមតាមមាត់ទន្លេ ដែលមានខ្សាច់
តាមអូរតូចៗ និងតាមអន្លង់ដែលមានជម្រៅទឹកកន្លះ

ម៉ែត្រ។ បាយលាយជាមួយកន្ទុក ត្រូវប្រើធ្វើជាទីស្នាក់ ដែលអាចចាប់បានប្រភេទត្រីរាល (*Henicorhynchus lobatus*) ត្រីបង្គុយ (*Luciosoma bleekeri*) ត្រីអាចម៍កុក (*Labiobarbus siamensis*)។

ចាន់ (Chann) Drop-door Trap



This fishing gear is made of bamboo. It is placed in the river along a bamboo barricade.

It can be used to catch Kantheay- *Trionyx ornatus*, turtles, Trey Khya- *Hemibagrus wyckioides*, Trey stuak - *Wallago leeri*, Trey trawsak- *Probarbus jullieni*, Trey chhdaur - *Channa micropeltes*, Trey Romeas- *Osphronemus exodon*.

ឧបករណ៍នេសាទ ចាន់ ធ្វើពីឫស្សី

និងត្រូវគេដាក់ក្នុងទន្លេ តាមសំរាស់ឫស្សី។ ឧបករណ៍នេះ អាចចាប់បានប្រភេទត្រីកន្ទាយ (*Trionyx ornatus*)
អណ្តើក ត្រីខ្សា (*Hemibagrus wyckioides*) ត្រីស្ទាក់ (*Wallago leeri*) ត្រីត្រសក់ (*Probarbus jullieni*) ត្រីឆ្កែរ (*Channa micropeltes*) ត្រីរមាស (*Osphronemus exodon*)។

ឆ្នួន (Thnous) River Barrage with U-shaped Bagnets

Bamboo is woven into a wall to block streams or canals with small holes in the wall to allow the water to flow through. Thnous are then placed in front of those holes to catch fish.

Fish caught using this gear include Trey Ksan- *Channa gachua*, Trey Angdeing- *Clarias* spp., Trey Raws- *Channa marulius*, etc.

ធ្នស់ ជាប្រភេទឧបករណ៍នេសាទធ្វើពីឫស្សី ដែលគេច្រៀករួចត្បាញជារនាំង ដោយទុកអោយមានប្រហោង សម្រាប់ ទឹកហូរឆ្លងកាត់។ រនាំងឫស្សីនេះ ជាទូទៅត្រូវគេដាក់បង្អាំងអូរ ឬព្រែក។ ត្រីនឹងត្រូវចាប់បាន នៅពេលដែលពួកវាឆ្លងកាត់តាមប្រហោងឫស្សី នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងធ្នស់។ ប្រភេទត្រីដែលចាប់បាន រួមមានត្រីក្បាន (*Channa gachua*) ត្រីអណ្តែង (*Clarias spp.*) ត្រីរីស៍ (*Channa marulius*)...។

លាយ (Leay) Wedge trap



Made of bamboo to catch fish in rice fields, canals and small streams.

- Fish caught using this gear include Trey Ksan -*Channa gachua*, Trey Andaing- *Clarias batrachus*, Trey Raws- *Channa marulius*, etc.

លាយ ធ្វើពីឫស្សីដើម្បីចាប់ត្រីតាមស្រែ ប្រឡាយ និងអូរតូចៗ។ ត្រីដែលចាប់បាន

រួមមានត្រីក្បាន (*Channa gachua*) ត្រីអណ្តែង (*Clarias batrachus*) ត្រីរីស៍ (*Channa marulius*)...។

ឈ្មោង (Chhneang) Wedge Shaped Scoop Basket



- This is made of bamboo to catch fish in ponds and canals.
- It can be used to catch shrimp, crabs, snails, Trey Changwa - *Rasbora spp.*, Trey Kranh- *Anabas testudineus*, Trey Raws- *Channa marulius*, Trey Andaing- *Clarias batrachus*, Trey Chhlonh- *Macrognathus siamensis*.

ឈ្មោងធ្វើពីឫស្សីសំរាប់ជញ្ជាក់ត្រីតាមត្រពាំង និងប្រឡាយ។ ឧបករណ៍នេះ អាចជញ្ជាក់បានកម្ចីស ក្តាម ខ្យង ត្រីច្រវ៉ា (*Rasbora spp.*) ត្រីក្រាញ់ (*Anabas testudineus*) ត្រីរីស៍ (*Channa marulius*) ត្រីអណ្តែង (*Clarias batrachus*) ត្រីឆ្លូញ (*Macrognathus siamensis*)។

Scientific names of fish are from "Sesan River Fisheries Monitoring in Ratanakiri Province Northeast Cambodia: Before and After the Construction of the Yali Falls Dam in the Central Highlands of Viet Nam" (Ian G. Baird and Meach Mean 2005).

Appendix 4

Examples of Kbal Romeas Village NTFPs

ទំពាំងប្លូស្សី (Tompaign Russey) Bamboo shoots



Bamboo shoots can be found along riverbanks, and the banks of streams. They can be processed into different products and keep for a long time.

ទំពាំងប្លូស្សីមានដុះតាម ដងទន្លេ ដងអូរ។ ប្រជាជនអាចយកទំពាំងប្លូស្សីនេះមកកែច្នៃបានច្រើនមុខ ព្រមទាំងអាចទុកហូបបានយូរផងដែរ។

There are several kinds of bamboo varieties such as:

មានទំពាំងជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖

1) ទំពាំងប្លូស្សីស្រក (Tompaign Russey Srok)

This variety has large bulbs, fur, and a sweet taste.

មានមើមធំ មានរោម និងរស់ជាតិផ្អែម។

2) ទំពាំងប្លូស្សីខ្លី (Tompaign Russey Khley)

This variety is equal in size to a child's wrist, has black fur sticking to its skin and is more delicious than Tompaign Russey Prey.

មានមើមធំប៉ុនកដៃក្មេង មានរោមខ្មៅៗនៅសំបកហើយឆ្ងាញ់ជាងទំពាំងព្រៃ។

3) ទំពាំងប្លូស្សីព្រៃ (Tompaign Russey Prey)

This variety is equal in size to a large bulb and has no fur. When it is dug out of the ground, the part that was under the ground is tastier than the part that was above ground.

មានមើមធំល្មម ហើយសំបករបស់វាលឺងគ្មានរោម។ ទំពាំងនេះនឹងមានរស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ប្រសិនបើវាដុះកប់ក្នុងដី។

4) ទំពាំងឫស្សីលាត (Tompaing Russey Loak)

This variety is smaller than Tompaing Russey Prey and has a smooth skin.

មានមើមតូចជាងឫស្សីព្រៃ មានសំបកលឺងដូចឫស្សីព្រៃដែរ។

5) ទំពាំងឫស្សីក្រីប (Tompaing Russey Khseb)

This variety has a large bulb and has fur on its skin. The flesh is not as hard and delicious as other bamboo shoots.

មានមើមធំៗ សំបកមានរោម សាច់ទំពាំងរឹងមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចឫស្សីផ្សេងៗទេ

6) ទំពាំងឫស្សីព្រៃច (Tompaing Russey Prich)

This variety has a large bulb; the maximum size of its main stem is equal to the big toe. It has tough skin, a little fur, and its flesh is a bit hard.

មានមើមនិងដើមធំបំផុតប៉ុនមេជើង មានសំបករឹង និងមានរោមតិច រឹងសាច់វារៀងរឹងបន្តិច។

ផ្លែ (Phle) Fruits

ផ្លែ ភ្លៀវ (Phle Phnhiev) *Baccaurea ramiflora* fruit

Villagers like eating this fruit when it ripens. They can also sell it.

អ្នកភូមិនិយមហូប នៅពេលវាទុំ។ អ្នកភូមិក៏លក់ផ្លែភ្លៀវនេះផងដែរ។

ផ្លែគុយ (Phle Kuy) *Willughbeia edulis* fruit

Besides consumption, villagers can also sell this fruit. The vine can be used as a medicinal plant.

ក្រៅពីហូបហើយ អ្នកភូមិអាចលក់ផ្លែគុយ និងធ្វើជាថ្នាំបុរាណចំពោះវល្លិ៍របស់វា។

ផ្លែពង្រ (Phle Pong Ror) *Schleicheria oleosa* fruit

This fruit has a sweet and sour flavor. We eat it when it ripens. Its trunk can also be used as a traditional medicine.

ផ្លែពង្រ ហូបទៅមានរស់ជាតិផ្អែម អែម។ គេហូបផ្លែនេះនៅពេលវាទុំ ហើយគេក៏អាច

យកដើមវាទៅផ្សំធ្វើជាថ្នាំបុរាណផងដែរ។

ផ្លែស្រម៉ី (Phle Sramor) *Terminalia chebula* fruit Myrobalan fruit

This fruit is edible and can be used as a traditional medicine for the treatment of stomach diseases.

ផ្លែស្រម៉ី អាចហូបបាន អាចលក់ និងធ្វើជាថ្នាំបុរាណ (ថ្នាំក្រពះ)

ផ្លែញី (Phle Nhor) *Morinda citrifolia* fruit Noni fruit

This fruit is used as a traditional medicine for the treatment of stomach and intestinal diseases.

ផ្លែញី៖ គេយកផ្លែវាធ្វើជាថ្នាំក្រពះ និងពោះវៀន

ផ្កា (Phkar) Flowers

ផ្កាអណ្តែង (Phkar Andeng)



Consumption and sale.

Phkar Andeng is a plant that grows in the river, especially in locations where there is a flowing current of water.

There are two types of Phkar Andeng: Phkar Andeng Pleung and Phkar Andeng Bay. Phkar Andeng Pleung has red shoots and flowers. It has a bitter flavor. Phkar Andeng Bay has white shoots and flowers. It has a slightly sweet flavor.

It can be also used as a medicine for women after childbirth. It also acts as a shelter for fish.

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងលក់

ផ្កាអណ្តែង ជាពុទ្ធិជាតិមួយប្រភេទដែលមានដុះនៅក្នុងទន្លេ ពិសេសតាមតំបន់ដែលមានទឹកជួរ។

ផ្កាអណ្តែងមាន២ប្រភេទ គឺផ្កាអណ្តែងភ្លើង និងផ្កាអណ្តែងបាយ។ ផ្កាអណ្តែងភ្លើង មានត្រួយ និងផ្កាពណ៌ក្រហម ហើយពេលយើងហូបទៅ វាមានជាតិល្វឹងបន្តិច។ រីឯផ្កាអណ្តែងបាយ មានត្រួយ និងផ្កាពណ៌ស ប៉ុន្តែពេលហូបទៅ វាមានជាតិផ្អែមតិចៗ។ ប្រភេទផ្កានេះ អាចយកធ្វើជាឱសថបុរាណសំរាប់ស្រ្តីបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេរួច។ ម៉្យាងវិញទៀត វាក៏ជាជំរកសំរាប់ត្រីទាំងពងកូនផងដែរ។

ម្លប់ (Ma Om) *Limnophila aromatica*

A kind of grass similar to a vine that grows in the rice fields. It is very aromatic and flavorful. Villagers use it to enhance the flavor of soups. Some farmers collect and dry it for consumption as a preserved food.

ម្លប់គឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដូចជាវល្លិ៍ ដុះនៅតាមស្រែ។ វាមានក្លិនក្រហូបឆ្ងាញ់។ ប្រជាជន
និយមបេះមកបង់សំលរ ហើយអ្នកខ្លះបេះយកមកហាលទុកហូបបានយូរ។

ឆ្កែវ (P'dao) Rattan



Kbal Romeas village is abundant in rattan, which grows along the streams, on riversides, in the forest, on mountains, and along canals, especially in Phnom Roeng, O'Kranh stream and along the river. However, it is decreasing due to population growth and the increase in rattan top consumption, and also because of the land clearing carried out by the companies in the rattan area.

ភូមិក្បាលរមាស សំបូរចុងឆ្កែវណាស់ ដែលភាគច្រើនដុះនៅតាមអូរ មាត់ទន្លេ ក្នុងព្រៃ តាមភ្នំ
និងតាមមាត់ប្រឡាយ ជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំរឹង អូរក្រាញ់ និងតាមដងទន្លេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី
បរិមាណឆ្កែវ មានការថយចុះដោយសារតែកំនើនមនុស្សចេះតែកើនឡើងៗ
ហើយអ្នកហូបចុងឆ្កែវក៏ច្រើនដែរ។ ការថយចុះនេះ
ក៏ដោយសារការឈូសឆាយដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតំបន់ដែលសំបូរឆ្កែវផងដែរ។

There are four types of rattan in this village: water rattan, mountain rattan, wooden rattan and chicken-dunk rattan.

នៅភូមិនេះមានឆ្កែវចំនួន៤ប្រភេទ គឺឆ្កែវទឹក ឆ្កែវភ្នំ ឆ្កែវដំបង និងឆ្កែវអាចម៍មាន់។

- 1) ឆ្កែវទឹក (P'dao teuk) Water rattan: The shoots can be cooked, but the vines are useless as they are fragile.
អាចយកត្រួយមកធ្វើជាម្ហូបបាន ប៉ុន្តែមិនអាចយកវល្លិ៍របស់វាមកប្រើប្រាស់បានទេព្រោះវាស្រួយពេក។
- 2) ឆ្កែវភ្នំ (P'dao Phnom) Mountain rattan is slightly bitter, but sweet, and its vine can be used.

មានជាតិល្វីងតិចៗ ប៉ុន្តែផ្អែម ហើយវល្លិ៍របស់វាអាចយកមកប្រើប្រាស់
និងកែច្នៃបានច្រើនយ៉ាង។ឆ្កែវដំបង។

3) ផ្ដៅដំបង (P'dao dambang) Wooden rattan: The shoots are sweet, but its vine is stiff and does not bend.
ត្រូវមានជាតិផ្អែម គេមិនសូវយកមកកែច្នៃ ឬប្រើប្រាស់ទេ ព្រោះវាល្អិតរឹង និងពិបាកពុតខ្លាំងណាស់។

4) ផ្ដៅអាចជ័រម៉ាន់ (P'dao ach moan) Chicken-dunk rattan: It cannot be eaten as it is bitter, but it is used to make
Kaphar and baskets. It can be used to make ropes to tie cattle, to build houses, trellises and other tools.

មិនអាចហូបបានទេ ដោយសារវាល្អិតពេក ប៉ុន្តែគេច្រើនយកមកត្បាញធ្វើជាកាដាវ កញ្ជ្រែង
ឬកន្ត្រក់ប៉ុណ្ណោះ។ គេក៏អាចប្រើធ្វើវាជាខ្សែសម្រាប់ចងគោ ឬក្របី ធ្វើជាទ្រើងដំណាំ
និងធ្វើជាឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ផ្សិត (Phset) Mushrooms

1) ផ្សិតរងា (Phset Rognea)



Grows on dead trees, generally on *Shorea obtusa* (ផ្ទឹក Phchik), *Couroupita guianensis* (Raing រាំង), *Shorea Talura* (Por Pel ពពែល). The harvest season is between November and December.

ផ្សិតគឺជាបន្លែធម្មជាតិយ៉ាងសំខាន់សំរាប់អ្នកភូមិយើងហូប ហើយក្រៅពីហូប

ក៏អាចលក់យកប្រាក់ផងដែរ។ ផ្សិតភាគច្រើនដុះលើដើមឈើដែលងាប់ ដូចជានៅលើដើមផ្ទឹក (*Shorea obtusa*) ដើមរាំង (*Couroupita guianensis*) ដើមពពែល (*Shorea Talura*) ។ល។

ការប្រមូលផលផ្សិត ភាគច្រើននៅចន្លោះខែវិច្ឆិការ ដល់ខែធ្នូ។

2) ផ្សិតក្បោក (Phset Kngok)



Phset Kngok grows along the base of mounds or on high ground. There are white ones and yellow ones. The harvest season is between June and July.

ផ្សិតក្បោក ដុះនៅដីតាមទួល ឬតាមពំនូកដីខ្ពស់ៗ។

ការប្រមូលផលផ្សិតក្បោក ភាគច្រើននៅចន្លោះខែមិថុនា ដល់ខែកក្កដា។

3) ផ្សិតប៉ក់ (Phset Pok)

There are two types (Phset Pok ផ្សិតប៉ក់ and Phset Ambos ផ្សិតអំបោះ). Villagers prefer to eat Phset Pok because it tastes better. In addition, it has a higher market price. The harvest season is between May and June.

ផ្សិតប៉ក់មាន២ប្រភេទ គឺផ្សិតប៉ក់ និងផ្សិត ផ្សិតអំបោះ។ អ្នកភូមិចូលចិត្តបរិភោគផ្សិតប៉ក់ជាង ព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់។ លើសពីនេះ ផ្សិតប៉ក់ក៏មានទីផ្សារល្អផងដែរ។ ការប្រមូលផលផ្សិតប៉ក់ គឺធ្វើនៅចន្លោះខែឧសភាដល់ខែមិថុនា។

៥) (Chor) Resin

1) ជ័រចុង (Chor Chong)



The resin is coagulated into pieces (the size of a big toe or forearm) on the trees. It can be mainly found on *Shorea obtusa* (Phchik), *Barringtonia acutangula* (Raing) trees. The resin is used as torch materials, glue to caulk boats and stick small items together. In the past, the villagers braided bamboo or rattan to make barrels and stuck them together with resin for drawing water.

ជ័រចុង មាននៅលើដើមឈើ ដែលមានសន្លាក់កកជាបំនែកដុំៗ ប៉ុនមេដឹង ឬកំភួនដែរ។ គេច្រើនឃើញជ័រចុងនៅដើមធ្លិក (*Shorea obtusa*) ឬ ដើមរាំង (*Barringtonia acutangula*)។ យើងអាចប្រើប្រាស់ជ័រចុងទាំងនេះសម្រាប់បិទទុក ធ្វើចន្លុះបំភ្លឺ និងបិទ ឬប៉ះវត្ថុ ឬសំភារៈប្រើប្រាស់តូចៗ។ កាលពីដើម អ្នកភូមិក្រុងឬស្សី ឬផ្តៅធ្វើផុង រួចយកជ័រចុងនេះបិទឲ្យជិត ដើម្បីអាចដងទឹកបាន។

2) ជ័រស្កុង (Chor Sa Ong)

This resin can be found in the holes of trees including *Lagerstroemia calyculata* (Srolao), *Irvingia malayana Oliv. ex Benn* (Chamboak), *Shorea obtusa* (Phchik). It is coagulated into pieces thicker than a thigh. Villagers collect it, and pound it, then mix it with liquid resin to caulk boats and for other equipment.

ជ័រស្កុង មាននៅក្នុងរូងដើមឈើមួយចំនួន ដូចជាដើមស្រឡៅ (*Lagerstroemia calyculata*) ដើមចំបក់ (*Irvingia malayana Oliv. ex Benn*) និងធ្លិក (*Shorea obtusa*)។ ជ័រស្កុង ក៏កកដូចជាជ័រចុងដែរ ប៉ុន្តែមានទំហំធំៗជាង គឺធំជាងភ្លៅមនុស្សទៀត។ ប្រជាជនយកវាមកបុកលាយចូលគ្នាជាមួយជ័រទឹក ដើម្បីបិទទុក ឬធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។

3) ជ័រទឹក (Chor teuk) Liquid resin



Villagers make holes in the trunks of *Dipterocarpus crissalatus* (Trach) and *Dipterocarpus alatus* (Chheu Teal) trees, then set it on fire for five minutes. After putting out the fire, they can collect the resin from the trees. Villagers use it to produce torches for sale.

ជ័រទឹក បានពីការចោះធ្វើរនក្នុងដើមឈើមួយចំនួន ដូចជាដើមត្រាច (*Dipterocarpus crissalatus*) ដើមឈើទាល (*Dipterocarpus alatus*) រួចដុតប្រហែល៥នាទីមុនពេលពន្លត។ រយៈពេលពី ២ទៅ៣ថ្ងៃបន្ទាប់ ទើបគេមកដងយកជ័រដែលចេញពីដើមឈើនោះ។ ប្រជាជនយកជ័រទឹកនេះមកធ្វើជាចន្ទ្រៈ ដើម្បីលក់នៅទីផ្សារ។

ខ្មៅ (khchaw) Shells



– Shells are found in rock holes.

ខ្មៅ នៅក្នុងថ្ម

ត្រី (krom) Clams



– Clams are found on rocks, and in mud at the riversides.

ត្រី នៅក្នុងថ្ម និងភក់ តាមមាត់ទន្លេ

Besides providing rice for year-round consumption, rice fields are also a habitat for crabs, snails, bullfrogs and fish. These are available early in the rainy season, but abundant from June to July.

ក្រៅពីបានស្រូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ ស្រែក៏ជាទីជម្រករបស់ពពួកក្ដាម ខ្យង កង្កែប ហ៊ីង និងត្រីផងដែរ។ ពពួកសត្វទាំងអស់នេះ អាចរកបាននៅក្នុងស្រែនៅដើមរដូវវស្សា ប៉ុន្តែសម្បូរបំផុតនៅចន្លោះខែមិថុនា ដល់ខែកក្កដា។

ក្ដាម (Kdam) Crabs



ខ្យង (Khchong) Snails



កង្កែប (Kong kaep) Frogs



ហ៊ីង (Hing) Chubby frogs



សង្កែល (Sangkoal) Turtles

There are several different types of turtles, including Sangkoal and Prich ព្រឹច, which are used for food.

Sek សែក, Kokou កីក្វី, and Dos ដុះ are caught for sale.

Villagers walk their dogs in the very early morning to chase the turtles.

មានសង្កែលជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាសង្កែល ព្រឹច ...ដែលគេចាប់សម្រាប់ធ្វើម្ហូប។ ពពួកសត្វស្លាបមួយចំនួន
ដូចជា សេក កក្វី ដុះ ក៏គេចាប់សម្រាប់ហូបផងដែរ។ អ្នកភូមិ ភាគច្រើនបណ្តើរឆ្កែនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម
ដើម្បីតាមរកពពួកសង្កែលនេះ។

ត្រកួត (Tror Kuot) *Varanus bengalensis nebulosus* Clouded monitors



សារិការកែវ (Sarika Keo) *Acridotheres javanicus* Wild pigs

ឃ្មុំ (Kmom) Bees

- 1) **ឃ្មុំខែចេត្រ** (Khnum Kheir Chet)
- 2) **ឃ្មុំរងារ** (Kmom Rongea)



Available in two seasons, Khnum Kheir Chet (April) and Khnum Rongea (December). The bees' honeycomb is for consumption, traditional medicine and to produce beeswax. Honeycomb can be soaked in wine to make a traditional medicine and to be sold.

មាន២រដូវដែលអាចរកឃ្មុំបាន គឺឃ្មុំខែចេត្រ ដែលរកបានក្នុងខែមេសា និងឃ្មុំរងារ

ដែលអាចរកបានក្នុងខែធ្នូ។ ឆ្កិតរបស់ឃ្មុំ គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ឬហូប ធ្វើជាថ្នាំសង្កូវ និង ធ្វើក្រមួន។ ឆ្កិតឃ្មុំនេះ ក៏អាចត្រាំស្រាធ្វើថ្នាំបុរាណ និងសម្រាប់លក់ផងដែរ។

Scientific names of NTFPs are from *Tovnah Khmer Online Dictionary* <http://dictionary.tovnah.com/>